

鹿児島県漁海況週報

平成17年10月27日(木)発行(10月20日～10月26日)
第2126報(旧暦:9月18～9月24日/月齢:16.7～22.7/潮汐:中潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、佐多岬の南6マイル附近と著しく接岸していた黒潮北縁域は、急激に南下し、10月26日現在、平瀬の北10マイル附近にある。

黒潮流軸(種子島東)

前週、種子島東51マイル付近にあった黒潮流軸は、そのまま動かず。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、全海域で前週より降温したが、平年比較では笠利崎が“かなり高め”のほかは、“やや高め～平年並み”となっている。



表面水温 (10/25～10/26)

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.0	-1.4	+0.6	やや高め
鹿児島	23.7	-1.6	+0.4	やや高め
佐多岬	24.7	-1.5	+0.4	平年並み
竹島	25.5	-0.7	+0.2	平年並み
屋久島	25.8	-0.8	+0.2	平年並み
中之島	26.7	-1.6	+0.7	やや高め
笠利崎	26.8	-1.0	+1.2	かなり高め
与路島	26.8	-1.6	+0.6	やや高め
与論	26.8	-1.5	+0.5	平年並み
甕海峡	24.7	-1.4	+1.4	やや高め
甕島西	25.4	-1.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は10/25～10/26
串木野 - 甕定期客船観測は10/26
甕島西(浮魚礁)観測は10/26

【漁況】

定置網

甕島ではカンパチ(0.6～1.0kg)が30～50kg/日、オカムシ(400g)が30～50kg/日、西薩南部ではサワラ(400～500g)が2トン/日、チウオ(300～400g)が50～300kg/日、イサキ(500g)が50～300kg/日、1日のみマアジ(40～50g)が1トン、鹿児島湾口薩摩半島側ではカンパチ(2～3kg)が500kg/日、ヒウオ(200g)が160～240kg/日、ゴマサハ(200～300g)が100～200kg/日、鹿児島湾口大隅半島側ではカマスサワラ(5～13kg)が15尾/日、ゴマサハ(200～300g)が300～350kg/日、ヤマカラス(200～300g)が150～200kg/日の入網。

パッチ網

西薩海域ではチリメンを1～8トン/統・日、一部で加里主体に4トン/統・日、大隅半島東部海域ではチリメンを1トン/統・日と好調。

キビナゴ刺網

甕島海域では7～8箱/隻・日、熊毛海域では10箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

種子島海域では中ヒを20～30箱/統・日、屋久島海域では中ヒを20～100箱/統・日の漁。

ブリ飼付け漁

甕島海域では3～4kgサイズを10～120尾/統・日、南薩海域では4～5kgサイズを180尾/統・日、鹿児島湾口薩摩半島側では4.5kgサイズを10～60尾/統・日、大隅半島南部では1統のみ3～4kgサイズを300尾/日の漁。

一本釣

甕島海域ではブリ(5～10kg)を26尾/隻・日、ケンサキイカ(200～400g)を28kg/隻・日、西薩海域ではカンパチ(600～800g)を20kg/隻・日、キダイ(200～300g)を20kg/隻・日、イトヅリ(200～300g)を20kg/隻・日、大隅半島南部海域ではハガツオ(2～3kg)を20～40kg/隻・日、熊毛海域ではウメイト(800g)を40～48kg/隻・日、ゴマサハ(300～600g)を40～50尾/隻・日、キダイ(200～250g)を15kg/隻・日、カンパチ(25kg)を4～5尾/隻・日の漁。


パシヨウカジキ情報

定置網では甕島海域で週計3尾(30～40kg)、西薩南部で1～2尾(18～35kg)/統・日、鹿児島湾口薩摩半島側で週計4尾(10～15kg)、鹿児島湾口大隅半島側で週計3尾(17～23kg)の漁で、流刺網は終漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2078報)				
								前週	前年同期			
								隻数	漁獲量			
旋網	阿久根	大	0	-		-	-	0	-	2	22	
		中	11	104	甕東 串木野	ゴマサハ小83 ゴマサハ中4 マアジ仔2	9.5		8	40	1	10
	枕崎	大	5	405	馬毛	ゴマサハ豆90 ゴマサハ小7 オカムシ3	81.1	好調	0	-	3	62
		中	12	531	湯瀬 馬毛	ゴマサハ豆82 ゴマサハ小10 阿アジ小7	44.2	好調	1	28	4	119
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	1	6
	山川	中	0	-			-	-	0	-	-	-
計	大	5	405			81.1		0	0	5	84	
	中	23	635			27.6		9	68	6	134	
東海旋網	阿久根	0	-			-	-	0	-	-	-	
	枕崎	1	238		ゴマサハ豆76 アカアジ19 阿アジ小4	238		0	-	-	-	
棒受網	阿久根	30	53	阿久根 長島	ソウダガツオ53 カクチイワシ45	1.8	好調	30	25	3	1	
	内之浦	0	-			-	-	0	-	-	-	
定置網	内之浦	40	23		ゴマサハ中18 カマス17 チウオ17 マアジ仔6	0.6		44	22	45	24	
刺網	阿久根	89	8	甕	キビナゴ100	0.1		50	5	43	3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-		-	-	0	-	-	-	
		小	0	-			-	-	1	6	-	-
	海旋	1	1		カツオ小57 カツオ中23 シビ20	1		2	1521	-	-	
	山川	中	7	26		カツオ小48 シビ40 カツオ大11	3.6		7	34	3	10
		海旋	2	1079		カツオ小74 シビ18 マハチ6	540		1	719	1	619
瀬戸内	小	8	4		キルダ41 マハチ39 カツオ20	0.5		2	1	-	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター10月25日発行「東シナ海海況情報第30号」による。黒潮流軸は、海上保安庁10月26日発行「海洋速報平成17年第42号」による。