

鹿児島県漁海況週報

平成18年2月16日(木)発行(2月9日～2月15日)
第2141報(旧暦:1月12～1月18日/月齢:10.5～16.5/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、平瀬の北7.67マイル付近にあった黒潮北縁域は、2月15日現在、やや北上し屋久島御崎の北8マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

黒潮流軸は、離岸傾向が続き、116マイルと著しい離岸となっている。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、佐多岬で“やや低め”の他は“平年並み”～“かなり高め”となった。



佐多岬
竹島
屋久島御崎
平瀬
中之島

表面水温

| 定点名 | 実測値 | 前週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 21.8 | -0.3 | +0.1 | 平年並み |
| 鹿児島 | 15.6 | -0.9 | -0.5 | 平年並み |
| 佐多岬 | 16.6 | -2.2 | -1.2 | やや低め |
| 竹島 | 19.1 | -0.3 | -0.1 | 平年並み |
| 屋久島御崎 | 21.8 | +2.6 | +2.0 | かなり高め |
| 中之島 | 20.8 | -1.4 | -0.5 | 平年並み |
| 笠利崎 | 21.1 | -0.6 | +0.3 | 平年並み |
| 与路島 | 21.3 | -0.8 | +0.5 | やや高め |
| 与論 | 21.6 | -1.2 | +0.4 | やや高め |
| 甌海峡 | 18.0 | +0.7 | +2.1 | かなり高め |
| 甌島西 | 19.2 | +0.7 | - | - |

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/15～2/16
串木野 - 甌定期客船観測は2/12 2/14～23はドック
甌島西(浮魚礁)観測は2/16

【漁況】

今週の特徴

月夜と時化のため全体的に低調な漁模様となった。

定量網

甌海域では、マアジ(50～300g)が100～300kg/日、ブリ(6～10kg)が週計で10尾の漁。西薩南部海域では、9日にマアジ(200g)が1トン、ブリ(4kg)が50尾、10日にサワラ(700g)が1トン、チヂオ(400g)が1トンの入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、1日のみマアジ(50g)が1.5トン、大隅半島側ではカクチイワシ大羽が1日のみ3トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がスルメイカ、ブリ、マアジ小主体に14.8トンの入網。志布志湾南部では、週計でスルメイカ、ブリ、カクチイワシ主体に3.7トンの入網。

キビナゴ刺網

甌島海域では、2～7箱/隻・日、熊毛海域では、4箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 評価 | 前年同期(第2093報) | | | | |
|-------|------|-----|---------|----------------------|----------------------|-------------------------|------|--------------|-------|--------|---------|-----|
| | | | | | | | | 前週隻数 | 前週漁獲量 | 前年同期隻数 | 前年同期漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 0 | - | - | - | - | 3 | 30 | 1 | 2 | |
| | | 中 | 1 | 2 | 長島 | カクチイワシ100 | 1.7 | 6 | 30 | 0 | - | |
| | 枕崎 | 大 | 2 | 39 | 馬毛 | ゴマサハ小66 ウルメイワシ26 オアカム07 | 19.7 | 4 | 257 | 1 | 29 | |
| | | 中 | 2 | 87 | 馬毛 | ゴマサハ小56 オアカム25 アカアジ18 | 43.6 | 好調 | 8 | 338 | 1 | 9 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | - | |
| | 山川 | 中 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| | 計 | 大 | 2 | 39 | - | - | 19.7 | 7 | 287 | 2 | 31 | |
| | | 中 | 3 | 89 | - | - | 29.6 | 15 | 371 | 1 | 9 | |
| | 東海旋網 | 阿久根 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| | | 枕崎 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 367 | 2 | 924 |
| 棒受網 | 阿久根 | 7 | 5 | 長島 阿久根 | カクチイワシ80 ウルメイワシ20 | 0.8 | 23 | 21 | 3 | 1 | | |
| | 内之浦 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| 定量網 | 内之浦 | 49 | 15 | スルメイカ50 ブリ8 マアジ小7 | 0.3 | 51 | 18 | 51 | 40 | | | |
| 刺網 | 阿久根 | 69 | 6 | 甌 | キビナゴ100 | 0.1 | 61 | 3 | 54 | 4 | | |
| カツオ竿釣 | 枕崎 | 大 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
| | | 小 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| | 海旋 | 2 | 1029 | カツオ小54 カツオ中30 カツオ大10 | 514.0 | 0 | - | 1 | 723 | | | |
| | | 中 | 2 | 9 | カツオ大76 カツオ中13 カツオ小11 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | | |
| | 海外旋網 | 山川 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 瀬戸内 | 小 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | | |

トビウオロープ曳


熊毛海域では、大比を20～100箱/統・日と好調。

ブリ銅付け漁

鹿児島湾口大隅半島側では、5～10kgを20尾/統・日の漁。

一本釣り・その他

西薩海域では、刺網でヒラメ(1～1.5kg)が20～30kg/隻・日の漁。ヨコワ曳縄は、1.0～1.5kgサイズを多い船で10尾/隻・日の漁と低調。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(0.3～0.8kg)を100尾/隻・日と好調、メダイ(4～5kg)を20～30尾/隻・日の漁。奄美海域南部でのソデイ旗流し漁は、4～5日操業で14kgサイズ主体に30～100尾/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター2月14日発行「東シナ海海況情報第45号」による。黒潮流軸は、海上保安庁2月15日発行「海洋速報平成18年6号」による。