



## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、平瀬付近に位置していた黒潮北縁域は、南下し、4月30日現在、中之島の南24マイル付近で、離岸傾向にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週と変わらず68マイルにあり、平均的な位置にある。

### 定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、笠利崎で“著しく高め”、黒潮流域、与路島で“やや高め”、屋久島御崎、与論で“やや低め”、中之島で“かなり低め”、その他の海域で“平年並み”となった。



## 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.1	+0.0	+0.7	やや高め
鹿児島	18.0	+0.5	-0.7	平年並み
佐多岬	19.5	+1.5	-0.2	平年並み
竹島	20.8	+0.8	-0.2	平年並み
屋久島御崎	20.8	-1.3	-1.1	やや低め
中之島	22.3	-1.9	-1.6	かなり低め
笠利崎	24.6	+0.8	+1.8	著しく高め
与路島	23.0	+1.0	+0.5	やや高め
与論	22.3	+0.1	-0.7	やや低め
甞海峡	18.4	+0.8	-0.7	平年並み
甞島西	18.1	+1.0	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/30～5/1  
串木野 - 甞定期客船観測は 5/2  
甞島西(浮魚礁)観測は5/2

## 【漁況】

### 定置網

西薩南部海域では、マアジ(200～300g)が17kg/日、チダイ(200g)が17kg/日と低調。鹿児島湾口薩摩半島側では、ヒラマサ(3～5kg)が80～90尾/日と低調。鹿児島湾口大隅半島側では、カクチイワシ(10cm)が700～800kg/日、週計でマアジ(100～300g)が3トン、ブリ(4～5kg)が90尾と低調。志布志湾南部海域では、週計によりウルメイワシを1.8トン、サハ類を1.0トン、チダイを0.4トンの漁。大隅半島東部海域では、週計により延べ39統がマアジ、ソウダガツオ、カクチイワシ主体に26トンの漁。甞島海域では、ヒラマサ(1kg)が10kg/日と低調。

### キビナゴ刺網

甞島海域では、10箱/隻・日の漁。  
鹿児島湾口大隅半島側では、3～4箱/隻・日と低調。

### トビウオロープ曳

熊本海域では、大ヒを30箱/統・日、中ヒを85箱/統・日、中中ヒを13箱/統・日、アコを70箱/統・日と好調。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2104報)				
								前週 隻数	前週 漁獲量			
旋網	阿久根	大	0	-	-	-	-	1	9	8	58	
		中	10	39	甞東 川内沖 串木野沖 長島	マアジ小52 マアジ豆19 アアジ豆7	3.9	低調	9	23	18	94
	枕崎	大	2	311	宇治 馬毛	ゴマサハ中小96 ゴマサハ中3 トラ小1	155.4	好調	3	256	0	-
		中	8	378	竹島沖 宇治 佐多沖	ゴマサハ中小64 ゴマサハ中27 ゴマサハ大6	47.2	好調	4	226	15	470
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	1	6	
	計	大	2	311	-	-	155.5	-	4	265	8	58
	中	18	417	-	-	23.2	-	13	249	34	570	
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	1	84	ゴマサハ中小67 ハビキ12 ゴマサハ中10	84.4	-	0	-	1	222	
棒受網	阿久根	12	22	阿久根	カクチイワシ100	1.8	-	14	20	33	22	
	内之浦	0	-	-	-	-	-	0	-	2	1	
定置網	内之浦	39	26	マアジ37 ソウダガツオ20 カクチイワシ13	0.7	-	44	33	55	48		
刺網	阿久根	48	7	甞	キビナゴ100	0.1	-	75	11	85	23	
	カツオ竿釣	大	1	422	カツオ中80 カツオ小19 キルガ1	422.2	-	0	-	0	-	
小		1	11	-	11.0	-	3	28	0	-		
海旋		1	804	カツオ小75 カツオ中21 キルガ3	804.0	-	2	1172	0	-		
海外旋網	中	4	4	カツオ小89 シイ1	1	-	4	13	12	31		
	山川	0	-	-	-	-	1	822	1	520		
	瀬戸内	小	-	-	-	-	-	7	5	-	-	

### パッチ網

西薩海域では、シラスを生で3.5～7.0トン/統・日と好調。西薩南部海域では、シラスを生で2.2～3.0トン/統・日と好調。志布志湾では、週計によりシラスを生で3.5トン/統と好調。

### ゴチ網


西薩海域では、マダイ(2～5kg)を30～200kg/隻・日、チダイ(150～300g)を50～60kg/隻・日と好調。

### 一本釣・その他

熊本海域では、一本釣りによりマダイ(3～6kg)を10尾/隻・日、カンパチ(4～30kg)を100kg/隻・日、ゴマサハ(400)を20～30尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業によりトサカリを週計で20トンと好調。志布志湾では、小型底曳網でウチワエビ(100g)を20～30kg/隻・日の漁。

### モジコ情報(4月13日解禁)

前週に引き続き低調に推移し、15～20kg/隻・航海の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター5月2日発行「東シナ海海況情報第5号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁4月26日発行「海洋速報平成18年第16号」による。