




【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
前週、中之島の南3.1マイル付近に位置していた黒潮北縁域は北上し、7月10日現在平瀬の北9.8マイル付近で、平均的な位置となっている。

黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は、前週に引き続き、69マイルと著しく離岸傾向にある。

定期客船等による表面水温
各海域の表面水温は、鹿児島で“かなり高め”、黒潮流域と中之島、与路島で“やや高め”、佐多岬で“かなり低め”、竹島と屋久島御崎で“やや低め”、その他で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.4	+0.6	+0.5	やや高め
鹿児島	27.8	+2.2	+1.7	かなり高め
佐多岬	24.0	-1.3	-1.8	かなり低め
竹島	25.5	+0.9	-1.3	やや低め
屋久島御崎	26.1	+0.2	-1.3	やや低め
中之島	28.8	+1.6	+0.6	やや高め
笠利崎	28.4	+0.1	+0.3	平年並み
与路島	28.4	+0.9	+1.1	やや高め
与論	27.9	-0.6	-0.2	平年並み
甞海峡	25.8	+0.9	+0.2	平年並み
甞島西	26.7	+1.6	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/10～7/11
串木野 - 甞定期客船観測は7/12
甞島西(浮魚礁)観測は7/12

【漁況】

今週の特徴
台風3号による時化の影響で、全般的に低調な漁。まき網も9日からの月夜でまとまった漁は無かった。

定置網
鹿児島湾口大隅半島側では、週計でヤマトマス(200～300g)が100kg、ヒウオ(200g前後)が80kg、志布志湾南部海域では、週計でマアジ主体に23.8トンの漁。

キビナゴ刺網
甞島海域では5～6箱/隻・日、鹿児島湾口大隅半島側では3～4箱/隻・日の漁。

パッチ網
西薩海域・志布志湾海域とも水揚げは無かった。

ゴチ網
北薩海域ではタイ(200g)を10～20kg/隻・日、西薩海域では多いところでタイ(1～2kg)を50～80kg/隻・日、西薩南部海域では1隻のみマアジ(200g)を30kg/日の漁。

ぶぐ籠
北薩海域では、サハフグ(300g)が300kg/隻・日、西薩海域では、サハフグ(200～300g)が100kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養殖別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2113報)				
								前週 隻数	前週 漁獲量			
旋網	阿久根	大	2	28	縄瀬	サハ類豆89 ウルメイワ9 スルメイカ1	14.0	0	-	3	26	
		中	9	22	長島 縄瀬 阿久根沖 川内沖	カクチイワ39 サハ類豆19 コソバ9	2.5	16	40	16	129	
	枕崎	大	2	167	西新首根	ゴマサハ中79 ゴマサハ中小11 クサヤ目小4	83.6	10	380	1	21	
		中	0	-	-	-	-	24	669	15	575	
	内之浦	中	0	-	-	-	-	1	5	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	1	5	
	計	大	4	195	-	-	-	48.8	10	380	4	47
		中	9	22	-	-	-	2.5	41	714	32	709
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	枕崎	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	35	26	阿久根 長島	ヒナゴ36 ウルメイワ36 カクチイワ26	0.7	低調	54	32	119	65	
	内之浦	1	1	-	ウルメイワ68 マイワ32	1.0	-	24	27	10	8	
定置網	内之浦	43	45	-	マアジ豆26 カマ22 ウルメイワ12	1.1	-	49	38	43	49	
刺網	阿久根	57	9	甞 阿久根	ヒナゴ100	0.2	低調	84	15	81	14	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
		小	0	-	-	-	-	0	-	1	2	
	海旋	0	-	-	-	-	-	1	812	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	-	0	-	2	9
		海旋	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
瀬戸内	小	0	-	-	-	-	-	17	12	4	4	

小型底曳網

大隅半島東部海域で、1日のみイサダイ(100g)を30kg/隻、ハモ(1kg)を100kg/隻の漁。

一本釣・その他

西薩海域では、刺網でタイ(250～300g)を15kg/隻・日、延縄でイサダイ(300～600g)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(80～90g)を30kg/隻・日、一本釣りで多い日にイサキ(200～300g)を20～40kg/隻・日、鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣りでゴマサハ(400～500g)を200kg/隻・日、イサキ(200～400g)を150kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(600～800g)を30kg/隻・日、熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(500g)を70～80尾/隻・日、ウメロ(800g～1kg)を30kg/隻・日、カンパチ(5～13kg)を5～6尾/隻・日、曳縄でカツオ(3～4kg)を20尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター7月11日発行「東シナ海海況情報第15号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月12日発行「海洋速報平成18年第27号」による。