

鹿児島県漁海況週報

平成19年2月22日(木)発行(2月15日～2月21日)
第2193報(旧暦:12月28日～1月4日/月齢:27.0～3.4/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市若本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週(2月13日)に屋久島御崎の南0.8マイル付近にあった黒潮北縁域はやや南下し、2月20日現在、平瀬の北10マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週よりやや接岸し40マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して鹿児島、佐多岬、甌島西で0.1～0.5 降温し、笠利崎は同温、その他の定点では0.2～1.7 昇温した。平年比較では黒潮流域が“著しく高め”、中之島が“かなり高め”、与路島、与論が“やや高め”、その他の海域では“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.6	+1.7	+1.9	著しく高め
鹿児島	16.2	-0.5	+0.2	平年並み
佐多岬	17.4	-0.5	-0.2	平年並み
竹島	19.1	+0.2	+0.1	平年並み
屋久島御崎	20.1	+0.8	+0.3	平年並み
中之島	22.8	+1.2	+1.5	かなり高め
笠利崎	20.6	+0.0	-0.2	平年並み
与路島	21.1	+0.2	+0.4	やや高め
与論	21.4	+0.4	+0.3	やや高め
瀬海峽	-	-	-	-
甌島西	17.7	-0.1	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は2/20～2/21
串木野 - 甌定期客船観測はドック中につき欠測
甌島西(浮魚礁)観測は2/21

【漁況】

定置網

甌島海域では、カンパチ(2kg)が1日1統のみ50kg、ブリ(8kg)が100kgの入網。西薩南部海域では、カンパチ(1.2～2kg)が1日1統のみ40尾、ブリ(9kg)が30尾、カクチイワシが1.5～2トン/統・日、ヒラキが300～350kg/統・日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではマアジ(70～80g)が10～50箱/統・日、カンパチ(1kg前後)が10～50尾/統・日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カクチイワシが0.8トン/統・日、マアジ(約45g)が約250kg/統・日の入網。大隅半島東部海域では、週計で59統がスルメイカ、マアジ小、サハ中主体に17.6トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、サワラ、マアジ等が2.8トンの入網。

キビナゴ流網

甌島海域では、4箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では5～10箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

熊本海域で、大ビを50～200箱/隻・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域で、少し操業が見られ始めたものの入札はなし。

刺網

西薩海域では、ヒラメ(1kg)を3～30尾/隻・日の漁。2日間のみサワ(約2.5kg)を約40尾/隻・日の漁。

一本釣・その他

西薩海域では、一本釣でマアジ(200～400g)を約20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、ゴマサハ(500～700g)を約60kg/隻・日、イサキ(300～800g)を40～50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でイホダイ(100～150g)を40～50kg/隻・日、マアジ(200g)を20～30kg/隻・日、の漁。熊本海域では、一本釣でマアジ(5kg)を2～60尾/隻・日、ゴマサハ(400～500g)を30～100尾/隻・日、ムツ(4～14kg)を8～10尾/隻・日の漁。

曳網

西薩南部海域では、1日のみココウ(1.2～1.3kg)主体にカツオ、スマじりて20～100kg/隻・日の漁。


ソデカ旗流し

奄美海域では、1隻のみ3日操業で10～20kgサイズを400kgの漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	8	179	縄瀬 野間 甌西	サハ類小40 サハ類豆36 マアジ仔9	22.4	6	168	5	90
		中	16	164	串木野沖 縄瀬 長島 阿久根沖	カクチイワシ21 サハ類小20 マアジ小19	10.3	9	122	5	30
	枕崎	大	2	48	野間沖	マサハ中71 マアジ豆23 ウルメイワシ5	24.1	1	36	3	249
		中	18	313	内之浦沖 島間 野間沖 種子島東	マアジ豆33 ゴマサハ中小25 ゴマサハ中12	17.4	19	630	2	47
	内之浦	中	3	15		マアジ小96 ウルメイワシ2 サハ類中1	5.0	2	5	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	10	228			22.8	7	204	8	339
		中	37	492			13.3	30	757	7	77
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	4	669		ゴマサハ中小47 ゴマサハ小18 クササエロ中小8	167.3	8	1292	5	1050
棒受網	阿久根	41	48	長島 阿久根	カクチイワシ96 キビナゴ4	1.2	14	25	21	23	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	59	18		スルメイカ39 マアジ小9 サハ類中7	0.3	61	24	53	20	
刺網	阿久根	68	5	甌 長島 阿久根沖 牛深	キビナゴ100	0.1	60	5	66	6	
カツオ竿釣	枕崎	大	2	407		カツオ中89 カツオ大11	203.5	0	-	0	-
		小	0	-			-	0	-	1	10
	海旋	3	1682		カツオ小67 キルガ14 カツオ中13	561.0	0	-	2	1528	
		0	-			-	0	-	2	2	
海外旋網	山川	中	0	-		-	0	-	2	2	
	海旋	1	643		カツオ小96 カツオ中2 キビ2	643.0	1	375	1	791	
	瀬戸内	小	4	3		0.6	6	4	1	0	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター2月20日発行「東シナ海漁況情報第46号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月21日発行「海洋速報平成19年第33号」による。