



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週より南下し5月29日現在、屋久島御崎の南約6マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より11マイルほど離岸し、46マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して与路島で0.9 降温し、その他の海域では0.4～3.9 昇温した。平年比較では黒潮流域、甌海峡で“やや高め”、佐多岬～中之島で“かなり高め～著しく高め”、笠利崎、与路島で“著しく低め”、それ以外の海域で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.6	+0.7	+0.7	やや高め
鹿児島	21.4	+1.4	+0.1	平年並み
佐多岬	23.7	+3.1	+2.0	著しく高め
竹島	24.7	+3.9	+1.9	かなり高め
屋久島御崎	25.3	+0.4	+1.7	かなり高め
中之島	26.3	+0.9	+1.0	かなり高め
笠利崎	22.5	+0.9	-1.7	著しく低め
与路島	21.9	-0.9	-2.0	著しく低め
与論	24.7	+1.5	+0.4	平年並み
甌海峡	21.9	+1.7	+0.7	やや高め
甌島西	22.1	+0.8	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は5/29～5/30
串木野 - 甌定期客船観測は5/30
甌島西(浮魚礁)観測は5/30

【漁況】

今週の特徴

まき網が薩摩半島西部海域でマワシをまとまって漁獲、熊毛海域ではゴマサハが好調。

定置網

甌海域では、マジジが約150kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(4～5kg)が50～100尾/日、ヒウオ(200g)が200～300kg/日、一日だけイサキ(500～700g)が300kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ハガツオ(1.5kg)が100～150kg/日、イサキ(300～800g)が50～100kg/日、一日だけコサハ(700g)が700kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側ではゴマサハ(500～700g)が1～4トン/日、マジジ(50g)が約600kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で58統がウルメイワシ、マワシ主体に53トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチワシ、ウルメイワシ主体に34.6トンの入網。

ごち網

西薩海域では、マダイ(0.5～1kg)を20～50kg/隻・日、チダイ(200～400g)を50～60kg/隻・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域では、シラス製品で約20トンの入札があった。西薩海域では、一日だけカリ主体を約6トン/統・日、その他は低調な漁。

トウオロブ曳

熊毛海域では、種子島西で、中、小混じりで50～100箱/統・日、屋久島南で中、中中、セミ混じりで30～70箱/統・日の漁。

キビナゴ刺網

甌海域では、10～20箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10～20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では約10箱/隻・日の漁。


一本釣・その他

西薩南部海域では、刺網でキス(90g)を約30kg/隻・日、一本釣でイサキ(500～700g)を約20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣でゴマサハ(500～800g)を30～40kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでハガツオ(2kg)を100～200kg/隻・日、ゴマサハ(600～800g)を70～80尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	前年同期(第2157報)						
						1日1統	評価	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	56	野間池沖 牛深沖	マワシ中58 マワシ小32 マジジ大9	11.2		3	5	0	-	
		中	103	野間池沖 長島 甌東 串木野沖	マワシ中35 コシロ28 マワシ小17	7.4		7	101	25	113	
	枕崎	大	182	甌東 西新首根	マワシ78 ゴマサハ中20	30.3	好調	8	779	2	85	
		中	486	種子島北端 種子島東 馬毛 内之浦沖	ゴマサハ中49 ゴマサハ中小37 ウルメイワシ10	32.4	好調	29	1107	17	492	
	内之浦	中	-	-	-	-		0	-	0	-	
	山川	中	-	-	-	-		0	-	0	-	
	計	大	11	238	-	-	21.6		11	784	2	85
		中	29	589	-	-	20.3		36	1208	42	605
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-		0	-	0	-
		枕崎	0	-	-	-	-		1	94	0	-
棒受網	阿久根	82	54	阿久根 長島	ウルメイワシ52 カクチワシ31 サハ類仔12	0.7		47	74	65	50	
	内之浦	3	4	-	ウルメイワシ79 マワシ21	1.3		5	5	3	2	
定置網	内之浦	58	53	-	ウルメイワシ26 マワシ23 カクチワシ14	0.9		56	46	44	63	
刺網	阿久根	86	24	甌 阿久根 牛深	キビナゴ100	0.3		90	31	95	25	
カツオ竿釣	枕崎	大	427	-	カツオ大79 カツオ中20	426.6		2	812	0	-	
		小	-	-	-	-		0	-	0	-	
	海旋	1	839	-	カツオ小64 カツオ中31 キルダ4	839.0		1	690	1	619	
	中	0	-	-	-	-		0	-	3	12	
	山川	0	-	-	-	-		0	-	0	-	
海外旋網	瀬戸内	小	-	-	-	-		10	11	6	7	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター5月29日発行「東シナ海海況情報第9号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月30日発行「海洋遠報平成19年第99号」による。