

鹿児島県漁海況週報

平成23年8月18日発行(8月11日～8月17日)
第2417報【旧暦:7月12日～7月18日/月齢11.3～17.3/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～カラ群島海域)


黒潮北縁域は8月17日現在、中之島の南15マイル付近と離岸している。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は8月16日現在、41マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、甌海峡で0.4～0.6℃降温し、黒潮流域、鹿児島、屋久島御崎で0.3～0.6℃昇温した。※沖縄航路の一部は先週欠測のため先週比較なし。
 平年比較では、与路島で“かなり低め”、中之島、与論で“やや低め”、その他の海域では“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 29.1 | +0.6 | +0.0 | 平年並 |
| 鹿児島 | 28.2 | +0.3 | +0.4 | 平年並 |
| 佐多岬 | 27.7 | -0.6 | -0.0 | 平年並 |
| 竹島 | 27.9 | -0.4 | -0.2 | 平年並 |
| 屋久島御崎 | 28.1 | +0.6 | -0.4 | 平年並 |
| 中之島 | 27.9 | - | -0.6 | やや低め |
| 笠利崎 | 27.8 | - | -0.4 | 平年並 |
| 与路島 | 26.6 | - | -1.5 | かなり低め |
| 与論 | 27.8 | - | -0.7 | やや低め |
| 甌海峡 | 27.9 | -0.6 | +0.0 | 平年並 |

鹿児島一那覇定期客船観測は8/17～18
 ※中之島、笠利崎、与路島、与論は先週欠測。
 串木野一甌定期客船観測は8/17

【漁況】

※時化の影響で全般に低調な漁模様。

○定置網

西薩南部海域では、マルソウダ(700g)が1日のみ11トン入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(2kg)が1日のみ500kg、カンパチ(5～6kg)が1日のみ100kg入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマルソウダ(300～500g)が2トン、カマスサワ(5～6kg)が6尾入網。大隅半島東部海域では、週計で38統がカマス、ウルメイワシ、サバ仔主体に21トン入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、マアジ、サバ類主体に6.5トン入網。

○キビナゴ刺網

甌海域では、2～4箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中ヒを9～22箱/統・日、セトヒを15～20箱/統・日の漁。

○バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で13～20kgのサイズが週計で14尾、鹿児島湾口部大隅半島側で27kgサイズが週計で1尾入網。

○その他


志布志湾海域では、底曳網でハヱ(1kg前後)を100kg/隻・日、イホダイ(100～200g)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでヒメダイ(600g)を50～60kg/隻・日の漁。奄美海域では、一本釣りの3日操業でチウオ(1～2kg)を多い船で180尾/隻、4～5日操業でキハダ(30～50kg)を8～24尾/隻の漁。

(まき網、専受網、カツオ平均的漁況は下記の表に記載していません。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2369報)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日 | | 前週 | | 前年同期 | |
|------------|-----|----|---------|---------|----------------------|--------------------------------|------|-----|-----|-------|-----|
| | | | | | | 1統 | 1隻 | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 0 | — | | — | 3 | 150 | 0 | — | |
| | | 中 | 7 | 33 | 長島 野間池沖 串木野沖 | カクチイワシ23 ウルメイワシ17 サバ仔16 | 4.7 | 17 | 173 | 8 | 56 |
| | 枕崎 | 大 | 2 | 52 | 坊津沖 竹島 | ウルメイワシ74 コマサハ豆10 マイワシ8 カクチイワシ8 | 26.0 | 4 | 197 | 1 | 8 |
| | | 中 | 5 | 72 | 坊津沖 竹島 種子島東 開聞沖 | ウルメイワシ59 コマサハ中小29 マイワシ7 | 14.4 | 3 | 40 | 5 | 68 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 2 | 52 | | | 26.0 | 7 | 347 | 1 | 8 | |
| | 中 | 12 | 105 | | | 8.8 | 20 | 213 | 13 | 124 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 26 | 64 | 阿久根沖 長島 | ウルメイワシ80 サバ仔8 マイワシ小 | 2.5 | 134 | 271 | 40 | 101 | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 1 | 1 | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 38 | 21 | | カマス38 ウルメイワシ18 サバ仔12 | 0.6 | 40 | 45 | 33 | 26 | |
| 刺網 | 阿久根 | 27 | 2 | 甌 | キビナゴ100 | 0.1 | 49 | 6 | 53 | 3 | |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 大 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | | 小 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | |
| | 海旋 | 0 | — | | | — | 0 | — | 2 | 1,611 | |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | |
| | 海旋 | 0 | — | | | — | 0 | — | 2 | 1,267 | |
| 瀬戸内 | 小 | — | — | | | — | — | — | — | — | |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月17日付「海況日報」による。
 黒潮流軸は、海上保安庁8月17日発行「海洋通報平成23年154号」による。