

鹿児島県漁海況週報

平成24年3月8日発行(3月1日～3月7日)
第2446報【旧暦:2月9日～2月15日/月齢8.2～14.2/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月7日現在、屋久島御崎の南10.4マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月6日現在、63マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、笠利崎で0.2～2.5℃降温し、その他の海域で0.1～2.6℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、鹿児島で“著しく高め”、佐多岬、竹島、中之島、甌海峡で“かなり高め”、与論で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 23.1 | +0.6 | +1.1 | 著しく高め |
| 鹿児島 | 19.6 | +2.6 | +3.6 | 著しく高め |
| 佐多岬 | 19.7 | +1.6 | +1.7 | かなり高め |
| 竹島 | 21.7 | +0.6 | +2.3 | かなり高め |
| 屋久島御崎 | 19.6 | -2.5 | -0.6 | 平年並 |
| 中之島 | 22.6 | +0.6 | +1.1 | かなり高め |
| 笠利崎 | 20.4 | -0.2 | -0.4 | 平年並 |
| 与路島 | 20.6 | +0.1 | -0.1 | 平年並 |
| 与論 | 21.4 | +0.7 | +0.3 | やや高め |
| 甌海峡 | 19.5 | +1.2 | +2.7 | かなり高め |

鹿児島一那覇定期客船観測は3/6～3/8
串木野一甌定期客船観測は3/7

【漁況】

○定置網

甌島海域では、マシ(50～60g)が700～800kg/日、メシナ(600g)が20～30kg/日、ウルメイワシ(200～300g)が1日のみ400kg、マダイ(1～3kg)が1日のみ30kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(6～7kg)が50～100尾/日、ブリ(1kg)が300～500kg/日、ヒラキ(5～6cm)が2日間のみ2～5t/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(2kg)が30尾/日、マシ(40g)が1日のみ2.7tの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサハ(100g)が2t、クロマグロ(2～3kg)が30尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がカマス、カクチイワシ、ブリ主体に19トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ブリ、チウオ主体に11.0トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを130～170箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを35～95箱/統・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ釣りの漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | ※前年同期(第2397報) | | | | | |
|------|-----|----|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 1日1統 | 前週隻数 | 前週漁獲量 | 前年同期隻数 | 前年同期漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 6 | 150 | 甌西 牛深沖 甌東 | マシ仔36 サハ類豆35 サハ類小14 | 25.0 | 4 | 91 | 0 | — |
| | | 中 | 7 | 108 | 野間池沖 牛深沖 長島 甌東 | ヘタ151 サハ類豆18 マシ仔11 | 15.4 | 5 | 14 | 0 | — |
| | 枕崎 | 大 | 0 | — | | | — | 3 | 204 | 0 | — |
| | | 中 | 12 | 398 | 立目崎沖 硫黄島沖 馬毛島 野間池沖 | コマサハ中小33 コマサハ小24 マシ豆15 | 33.2 | 20 | 748 | 0 | — |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 6 | 150 | | | 25.0 | 7 | 295 | 0 | 0 | |
| | 中 | 19 | 506 | | | 26.6 | 25 | 762 | 0 | 0 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 7 | 856 | オアカム029 クサヤモロ中小26 コマサハ中15 | | 122.2 | 2 | 371 | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 57 | 50 | 阿久根沖 長島 | カクチイワシ75 ウルメイワシ13 マシ小5 | 0.9 | 38 | 34 | 2 | 2 | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 47 | 19 | カマス30 カクチイワシ15 ブリ13 | | 0.4 | 45 | 13 | 45 | 65 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 0 | — | 甌 | キビナゴ100 | 0.0 | 56 | 3 | 40 | 2 |
| | | 小 | 0 | — | | | — | 0 | — | 1 | 104 |
| | 枕崎 | 大 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 小 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 海旋 | 大 | 0 | — | | | — | 3 | 2,730 | 2 | 952 |
| | | 小 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 海外旋網 | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | — | |
| 瀬戸内 | 小 | 大 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 小 | 1 | 672 | カツオ小75 キハダ25 | | 671.6 | 3 | 2,489 | 1 | 662 |

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～3箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、1～2箱/隻・日の漁。

○その他

甌島海域では曳縄でカツオ(3～6kg)が12～30尾/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(0.5～2kg)を2～30尾/隻・日、曳縄でカマスワラ(1～2kg)が5～6尾/隻・日、マダイ(0.7～2kg)を多い船で20kg/日の漁。西薩南部海域では、一本釣りでマダイ(1～1.4kg)が10尾/隻・日、刺網でヒラメ(1kg)を5～6尾/隻・日。志布志湾海域では建網でイセエビ(300～600g)を2～5kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでマダイ(2～7kg)を5～20尾/隻・日、コマサハ(500～600g)を30～40尾/隻・日、マダイ(4～5kg)を50～100尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しでソデイカ(胴体のみ10kg)を1～2日操業で20ハイ/隻、3～4日操業で40～50ハイ/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月7日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月7日発行「海洋通報平成24年45号」による。