

鹿児島県漁海況週報

平成26年4月24日発行(4月17日～4月23日)
第2553報【旧暦:3月18日～3月24日/月齢17.3～23.3/潮汐:中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月22日現在、屋久島御崎の南8.8マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)


種子島東の黒潮流軸は、4月22日現在、65マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、与路島で0.1～1.9℃降温し、その他の海域で0.2～1.7℃昇温した。

平年比較では、甌海峡で“かなり高め”、竹島で“やや高め”、鹿児島、笠利崎で“やや低め”、与論で“かなり低め”、与路島で“著しく低め”、その他の海域で“平年並”となった。

黒潮北縁域の位置



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.7	+0.3	-0.3	平年並
鹿児島	17.7	+0.4	-0.6	やや低め
佐多岬	19.2	+1.0	-0.2	平年並
竹島	21.5	+1.6	+0.7	やや高め
屋久島御崎	21.1	-1.9	-0.4	平年並
中之島	23.5	+0.2	-0.0	平年並
笠利崎	21.8	+0.3	-0.6	やや低め
与路島	20.9	-0.1	-1.2	著しく低め
与論	21.3	+0.3	-1.1	かなり低め
甌海峡	20.6	+1.7	+1.9	かなり高め

鹿児島～那覇定期客船観測は4/22～23
串木野～甌定期客船観測は4/23

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ブリ(5～8kg)が50～150尾/日、1日のみマアジ(100g前後)が300kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(6～7kg)が10～100尾/日、シラ(2kg前後)が多い日で300kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(50～100g)が4～7トン/日、1日のみサハ類(500～800g)が2.6トン、ブリ(5～7kg)が460尾、ヒラサ(4～8kg)が70尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ゴマサハ(500～600g)が1.5～3トン/日、マアジ(80～100g)が1～1.5トン/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で51統がサハ類小、カクチイワシ主体に69トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ニハ類、マアジ主体に25.1トンの入網。熊毛海域では、ゴマサハ(600～800g)が500～600kg/日の入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～4箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～15箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～15箱/隻・日の漁。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で34トンの入札があった。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを3～45箱/統・日、中トビを1～15箱/統・日、中トビを6～29箱/統・日、小トビを2～49箱/統・日の漁。

○モジャコ漁業

4月10日の操業開始以降、堅調な漁が続いており、ほぼ採捕目標数量に達した地区もある。県全体でも、開始から2週間の合計で目標数量の約6割に達している。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を40～100kg/隻・日、チダイ(300～400g)を多い日で100kg/隻の漁。刺網でコウイカ(1kg前後)を5～20kg/隻・日の漁。延縄でマダイ(1～1.5kg)を20～30kg/隻・日、アカマダイ(400～500g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.3～1kg)を25～35kg/隻・日、チダイ(200～300g)を20～30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳網でハクツオ(1.5～2kg)を50～60尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の2日操業でムツ(2～10kg)を40尾/隻、一本釣り1日のみチウオ(1～2kg)を50～100kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2504報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前週		前年同期	
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	7	甌西	チウオ99	6.8	2	6	0	—
		中	6	30	川内沖 串木野沖	マアジ71 マルアジ11	5.0	4	20	10	67
	枕崎	大	5	219	馬毛島	ゴマサハ中82 ゴマサハ中小16	43.7	2	45	1	15
		中	10	303	馬毛島 種子島南	ゴマサハ中69 ゴマサハ中小13 モロ小12	30.3	8	328	8	123
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	6	225	—	—	37.6	4	50	1	15	
	中	16	333	—	—	20.8	12	347	18	189	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	1	286	—	—	286.2	2	410	0	—	
棒受網	阿久根	12	14	阿久根沖 長島	カクチイワシ97	1.2	14	12	9	12	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	51	69	—	サハ類小75 カクチイワシ10	1.4	46	62	53	42	
刺網	阿久根	43	4	甌 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	40	3	29	4	
	大	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—	—	—	0	—	0	—	
		海旋	1	747	—	カツオ中47 カツオ小31 キハダ20	746.7	1	822	2	1,476
	山川	中	5	23	—	カツオ小45 カツオ大36 カツオ中11	4.6	2	5	5	36
		海旋	0	—	—	—	—	2	1,560	1	799



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月23日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月23日発行「海洋速報平成26年75号」による。