

鹿児島県漁海況週報

平成26年8月28日発行(8月21日～8月27日)
第2570報【旧暦：7月26日～8月3日/月齢25.2～1.5/潮汐：若潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月27日現在、屋久島御崎の南10.2マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月26日現在、23マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甌海峡で変わらず、鹿児島、佐多岬、竹島、屋久島御崎で0.1～0.8℃降温し、その他の海域で0.2～0.9℃昇温した。

平年比較では、笠利崎で“かなり高め”、与路島、与論で“やや高め”、鹿児島、竹島、甌海峡で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.5	+0.2	+0.3	平年並
鹿児島	27.1	-0.7	-1.0	やや低め
佐多岬	27.7	-0.1	-0.4	平年並
竹島	27.9	-0.8	-0.5	やや低め
屋久島御崎	28.4	-0.3	-0.2	平年並
中之島	29.0	+0.2	+0.3	平年並
笠利崎	29.8	+0.9	+1.4	かなり高め
与路島	28.9	+0.3	+0.5	やや高め
与論	29.3	+0.5	+0.6	やや高め
甌海峡	27.2	+0.0	-1.0	やや低め

鹿児島一那覇定期客船観測は8/27～28
串木野一甌定期客船観測は8/27

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、マジン仔が200～400kg/日、ハガツオ(1kg前後)が200～600kg/日、シラ(1～10kg)が2日間14トンの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(0.9～1.2kg)が1日のみ600kg、カンパチ(4kg前後)が多い日で50尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、シラ(5～6kg)が20～30尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で41統がカマス、マジン豆、ウルメイワシ主体に34トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカマス、マジン、チウオ主体に2.7トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを10箱/統・日、中トビを4～5箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを12～59箱/統・日、セトビを15～34箱/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～11箱/隻・日の漁。種子島海域では、3～4箱/隻・日の漁。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で8トンの入札があった。

○パショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で15～25kgサイズが1～5尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で週計で18～24kgサイズが3尾、鹿児島湾口部大隅半島側で週計で25kgサイズが3尾の入網。流し刺網では、鹿児島湾口部大隅半島側で週計で17～30kgサイズを12尾の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでカンパチ(3～10kg)を80～100kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(500～900g)を10～30kg/隻・日、チダイ(100～400g)を10～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(500g前後)を20～30kg/隻・日の漁。延縄でトヨタイ(300～400g)を10kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(300～500g)を5～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でイセエビ(150～200g)を10～60kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.8～1kg)を40kg/隻・日、トヨタイ(300g前後)を20kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200～900g)を8kg/隻・日の漁。かごでマゴ(1～2.5kg)を15kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りの3日操業でハマダイ(1～2kg)を100kg/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2～3日操業でチウオ(1～2kg)を80～220kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2512報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	187	野間池沖	マイワシ小29	37.3	4	169	3	287
		中	36	337	串木野沖 長島野間池沖 阿久根沖	コシロ23 マジン小18 ウルメイワシ13	9.4	13	77	16	145
	枕崎	大	12	560	野間池沖 甌下	ウルメイワシ40 マイワシ21 カタチイワシ17	46.7	7	348	1	69
		中	27	668	野間池沖 島間沖 宇治	ウルメイワシ31 カタチイワシ20 ゴマサバ豆18	24.7	13	252	13	197
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	17	747			43.9	11	517	4	356	
	中	63	1005			16.0	26	329	29	342	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	88	208	阿久根沖 長島	ウルメイワシ77 カタチイワシ21	2.4	8	5	65	115	
	内之浦	1	4		ウルメイワシ100	4.4	0	—	1	0.6	
定置網	内之浦	41	34		カマス28 マジン豆24 ウルメイワシ16	0.8	28	40	40	41	
刺網	阿久根	大	0	—	甌 川内沖 牛深沖	キビナゴ100	0.1	53	6	37	3
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
	海旋	0	—			—	0	—	1	663	
	山川	中	2	17		カツオ小87 キハダ10	8.7	3	17	0	—
	海旋	1	691		カツオ小55 キハダ32	691.0	0	—	1	781	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月27日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁8月27日発行「海洋速報平成26年161号」による。