

鹿児島県漁海況週報

平成26年10月30日発行(10月23日～10月29日)
第2579報【旧暦:9月30日～閏9月6日/月齢28.9～5.2/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月27日現在、屋久島御崎の南4.7マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月28日現在、23マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で変わらず、与論で0.4℃昇温し、その他の海域で0.1～1.0℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、屋久島御崎、中之島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|------|
| 黒潮流域 | 25.8 | -0.2 | -0.5 | やや低め |
| 鹿児島 | 23.7 | -0.3 | +0.3 | 平年並 |
| 佐多岬 | 24.2 | -0.1 | -0.1 | 平年並 |
| 竹島 | 24.9 | -1.0 | -0.3 | 平年並 |
| 屋久島御崎 | 25.0 | +0.0 | -0.5 | やや低め |
| 中之島 | 25.6 | -0.2 | -0.4 | やや低め |
| 笠利崎 | 25.6 | -0.5 | +0.0 | 平年並 |
| 与路島 | 25.7 | -0.3 | -0.3 | 平年並 |
| 与論 | 25.8 | +0.4 | -0.4 | 平年並 |
| 甕海峡 | 23.7 | -0.5 | +0.4 | 平年並 |

鹿児島一那覇定期客船観測は10/27-29
串木野一甕定期客船観測は10/29

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、トビウオ(200g)が100～500kg/日、ヤマトカマス(100g前後)が200～300kg/日、マアジが多い日で2トンの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(0.7～3kg)が1日のみ1トン、カンパチ(2.8～3.2kg)が1日のみ210尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カマスサワ(7～13kg)が5～20尾/日、フリ(2～3kg)が多い日で100尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で48統がカマス、マアジ豆、サゴシ主体に15トンの入網。志布志湾南部海域では、週計で48統、サワラ、チウオ主体に9トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを70～80箱/統・日、大トビを1日のみ15箱/統の漁。屋久島海域では、大トビを2～5箱/統・日、中トビを22～55箱/統・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～8kgサイズを30～300尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4kgサイズを300尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、5～6kgサイズを100尾/統・日の漁。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で14トンの入札があった。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | ※前年同期(第2530報) | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---------|---------|----------|---------------|----------|----------|--------|---------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 1日1統 | 前週隻数 | 前週漁獲量 | 前年同期隻数 | 前年同期漁獲量 | | | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 4 | 145 | 甕西 天草沖 | カクチイワシ67 | ウルメイワシ14 | マイワシ小6 | 36.3 | 3 | 106 | 0 | — |
| | | 中 | 15 | 163 | 甕西 甕東 | カクチイワシ61 | ウルメイワシ18 | サバ類豆6 | 10.8 | 31 | 551 | 18 | 147 |
| | 枕崎 | 大 | 10 | 459 | 甕東 野間池沖 | カクチイワシ70 | ウルメイワシ16 | マイワシ6 | 45.9 | 12 | 642 | 9 | 247 |
| | | 中 | 25 | 630 | 野間池沖 甕西 | カクチイワシ38 | クサヤモロ豆18 | クサヤモロ小10 | 25.2 | 16 | 252 | 27 | 570 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 14 | 604 | — | — | — | — | 43.1 | 15 | 748 | 9 | 247 | |
| 中 | 40 | 793 | — | — | — | — | — | 19.8 | 47 | 804 | 45 | 717 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 8 | 409 | — | マサバ豆75 | ゴマサバ豆11 | イカ類5 | 51.1 | 7 | 773 | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 48 | 75 | 阿久根沖 長島 | ウルメイワシ78 | マイワシ小6 | キビナゴ6 | 1.6 | 49 | 89 | 52 | 47 | |
| | 内之浦 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 48 | 15 | — | カマス36 | マアジ豆14 | サゴシ7 | 0.3 | 47 | 26 | 37 | 29 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 0 | — | 甕 川内沖 | キビナゴ100 | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 小 | 0 | — | 牛深沖 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 海旋 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1,343 | 2 | 1,694 | |
| | 山川 | 中 | 7 | 57 | — | キハダ35 | カツオ大30 | カツオ小27 | 8.2 | 2 | 15 | 4 | 15 |
| | 海旋 | 0 | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,958 | 3 | 1,473 | |

○キビナゴ刺網


甕島海域では、3～10箱/隻・日の漁。種子島海域では15箱/隻・日の漁。

○バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で27kgサイズが多い日で2尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側で20～28kgサイズが1～4尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では22～23kgサイズが2～4尾/日の入網。流し刺網では、鹿児島湾口部大隅半島側で22～33kgサイズが4～8尾/隻・日の漁。

○その他

甕島海域では、曳網でハカツオ(1.5～2kg)を1日のみ60尾/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマタイ(1～3kg)を20kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでゴマサバ(600～700g)を多い船で30kg/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でソコトヨリ(100～300g)を20～30kg/隻・日の漁。屋久島海域では、ゴマサバ(600～800g)を多い船で30尾/日の漁。奄美南部海域では、延縄の2日操業でムツ(1～2kg)を30kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月29日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁10月29日発行「海洋通報平成26年第203号」による。