

# 鹿児島県漁海況週報

平成28年6月23日発行(6月16日～6月22日)  
第2660報【旧暦:5月12日～5月18日/月齢11.0～17.0/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月21日現在、平瀬の南5.4マイル付近にあり、離岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月21日現在、66マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甑海峡、屋久島御崎で0.5～1.8℃降温し、その他の海域で0.1～2.5℃昇温した。

平年比較では、与路島、与論で“著しく高め”、鹿児島、竹島、笠利崎で“かなり高め”、その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.6	+0.1	+0.3	平年並
鹿児島	25.0	+0.8	+1.1	かなり高め
佐多岬	23.7	+0.3	-0.2	平年並
竹島	25.8	+1.9	+1.2	かなり高め
屋久島御崎	25.4	-1.8	+0.0	平年並
中之島	26.7	+0.4	+0.0	平年並
笠利崎	27.2	+1.4	+1.2	かなり高め
与路島	27.3	+1.3	+2.0	著しく高め
与論	28.2	+2.5	+2.1	著しく高め
甑海峡	23.9	-0.5	+0.3	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は6/21～22  
串木野一甑定期客船観測は6/22

## 【漁況】

### ○定置網

甑島海域では、週計でフリ(6～7kg)が2トン、スマ(1.5～2kg)が1.5トン、イサキ(0.5～1kg)が350kgの入網。西薩南部海域では、トビウオ(150～200g)が100～190kg/日、1日のみマルソウダ(700～800g)が645kg、マルアジ(200～400g)が200kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マシ豆が300kg/日、ハマフエキ(800g)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マシ豆が120kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で51統がウルメイワシ、カクチイワシ、マシ豆主体に40トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マシ豆、マダイ主体に14トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甑島海域では、5～9箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～6箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを120箱/統・日、小トビを80箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを8～102箱/統・日、小トビを23～68箱/統・日、青トビを11～14箱/統・日の漁。300kg/隻の漁。


## ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg前後主体)を20～50kg/隻・日、チダイ(100～500g)を10～100kg/隻・日、ヘダイ(0.7～1.2kg)を多い船で30kg/日の漁。一本釣りでイサキ(500g)を多い船で20kg/日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日200kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでイサキ(300～400g)を10～15kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(800～900g)を20kg/隻・日、イサキ(700～800g)を15kg/隻・日の漁。潜水器でサカリを300kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、一本釣りでイサキ(300～400g)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を30尾/隻・日、マダイ(4～7kg)を10尾/隻・日、アオダイ(0.4～1kg)を20kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の3日操業でマダイ(5～8kg)を10尾/隻、キンメダイ(1～3kg)を60kg/隻、チマキントキ(1kg前後)を50kg/隻、ムツ(1kg前後)を40kg/隻の漁。一本釣りの2日操業でチウオ(1～1.5kg)を80～300kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2611報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		中	0	—	—	—	31	377	46	413	
	枕崎	大	1	1	馬毛島	ゴマサハ中100	1.1	8	166	6	165
		中	1	20	内之浦沖	カクチイワシ50 ウルメイワシ30 マシ豆20	20.2	15	288	12	249
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	1	1	—	—	1.1	8	166	6	165	
中	1	20	—	—	—	20.2	46	664	58	662	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	35	43	阿久根沖 長島	カクチイワシ49 ウルメイワシ44	1.2	108	148	61	78	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	51	40	—	ウルメイワシ41 カクチイワシ15 マシ豆8	0.8	50	38	52	43	
刺網	阿久根	64	10	阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.2	141	27	105	15	
	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
小	0	—	—	—	—	0	—	0	—		
カツオ釣・海外旋網	海旋	0	—	—	—	—	3	2289	2	1,506	
	中	0	—	—	—	—	0	—	1	9	
	山川	海旋	1	1051	—	カツオ小44 カツオ中34 カツオ大14	1,051.3	1	783	2	1,210



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月22日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月22日発行「海洋通報平成28年114号」による。