

鹿児島県漁海況週報

平成28年8月18日発行(8月11日～8月17日)
第2668報【旧暦：7月9日～7月15日/月齢8.3～14.3/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月16日現在、屋久島御崎の北4.4マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月16日現在、62マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島で0.1℃降温し、その他の海域で0.3～1.3℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、竹島、屋久島御崎、中之島で“著しく高め”、佐多岬、笠利崎、与路島、甌海峡で“かなり高め”、与論で“やや高め”、鹿児島で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.6	+0.6	+1.3	著しく高め
鹿児島	28.3	-0.1	+0.1	平年並
佐多岬	29.4	+0.8	+1.3	かなり高め
竹島	30.0	+0.4	+1.6	著しく高め
屋久島御崎	30.2	+0.3	+1.5	著しく高め
中之島	30.2	+0.3	+1.4	著しく高め
笠利崎	30.0	+1.1	+1.4	かなり高め
与路島	30.0	+1.3	+1.6	かなり高め
与論	29.8	+1.3	+1.0	やや高め
甌海峡	30.1	+0.9	+1.9	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は8/16-17
串木野一甌定期客船観測は8/17

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、シラ(1kg前後)が1～2トン/日、マルウダ(500～800g)が500～600kg/日、ヒラソウダ(500～800g)が500～600kg/日、カンナチ(300～500g)が200～500kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.3kg)が350～600kg/日、ブリ(350～500g)が500kg/日、ヤマトカマス(150～200g)が400kg/日、ヒラソウダ(1～1.3kg)が200～400kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マルソウダ(300g)が0.5～1.5トン/日、ゴマサハ(200g)が260～390kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がソウダカツオ、カマス、マシ豆主体に25トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、カクチイワシ、ニハ類主体に4.5トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、3～6箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、3箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトビを8～21箱/統・日、中トビを3～12箱/統・日の漁。


○その他

西薩海域では、一本釣りでイサキ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を40kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～1kg)を10～60kg/隻・日、チダイ(200～500g)を20～40kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣りでイサキ(200～400g)を8kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハカツオ(2～3kg)を70kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(800g)を50kg/隻・日、ゴマサハ(500～800g)を10kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハヒ(1～2kg)を40kg/隻・日、マダイ(0.5～1.5kg)を10kg/隻・日の漁。曳縄でチウオ(1～2.6kg)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでハマダイ(1～6kg)を50kg/隻・日、アオダイ(0.5～1kg)を50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチウオ(1～2kg)を30kg/隻・日の漁。旗流しでキハダ(30～50kg)を10尾/隻・日の漁。延縄の2日操業でムツ(1～2kg)を150kg/隻、ナンヨウキンメ(1～2kg)を50kg/隻、キンメダイ(0.5～1kg)を20kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2619報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	126	甌東 天草沖	ウルメイワシ37 カクチイワシ24 マイワシ小21	25.1	9	248	0	—
		中	5	40	長島 野間池沖 細瀬	カクチイワシ31 サハ類小24 コシロ15	7.9	36	491	13	196
	枕崎	大	2	62	甌下	ゴマサハ豆16	31.2	9	502	4	308
		中	6	106	枕崎沖	ゴマサハ豆12 ウルメイワシ9	17.6	19	459	11	237
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	7	188			26.9	18	750	4	308	
	中	11	145			13.2	55	950	24	433	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	0	—			—	122	199	62	103	
	内之浦	2	4		ウルメイワシ98	2.0	1	1	1	0.1	
定置網	内之浦	35	25		ソウダカツオ33 カマス21 マシ豆11	0.7	45	26	25	11	
刺網	阿久根	大	22	2	阿久根沖 甌長島	キビナゴ100	0.1	63	9	24	3
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	海旋	1	755		カツオ中55 キハダ19 カツオ小17	754.9	1	728	1	769
		中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	海旋	1	735		カツオ小72 カツオ中14 キハダ7	735.5	2	715	1	776



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月17日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月17日発行「海洋通報平成28年152号」による。