

# 鹿児島県漁海況週報

平成28年11月17日発行(11月10日～11月16日)  
第2680報【旧暦：10月11日～10月17日/月齢10.4～16.4/潮汐：若～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月15日現在、屋久島御崎の北8.7マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月15日現在、36マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で0.2℃昇温し、その他の海域で0.1～2.3℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、屋久島御崎、中之島で“著しく高め”、笠利崎で“かなり高め”、鹿児島、与路島、与論で“やや高め”、佐多岬、甌海峡で“平年並”、竹島で“やや低め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.3	-0.2	+1.0	著しく高め
鹿児島	22.4	-0.7	+0.6	やや高め
佐多岬	22.4	-2.3	-0.3	平年並
竹島	23.4	-0.8	-0.5	やや低め
屋久島御崎	25.9	+0.2	+1.6	著しく高め
中之島	26.2	-0.3	+1.2	著しく高め
笠利崎	25.5	-0.1	+0.9	かなり高め
与路島	25.4	-0.1	+0.5	やや高め
与論	25.7	-0.7	+0.6	やや高め
甌海峡	22.1	-0.7	+0.4	平年並

鹿児島～那覇定期客船観測は11/15～11/16  
串木野～甌定期客船観測は11/16

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、コマサハ(500g)が30kg/日の入網。西薩南部海域では、サワラ(500～600g)が多い日で8ト、コマサハ(300g)が100～300kg/日、ヤママス(150～200g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、コマサハ(500g)が240～300kg/日、カンパチ(0.5～1kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、シラ(1～2kg)が420kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がサバ類中、ソダガツオ、ムロアジ主体に26トの入網。志布志湾南部海域では、週計でサワラ、チウオ、ヒラシ類主体に15.8トの入網。

### ○パッチ網

西薩海域では、製品で16トの入札があった。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgサイズを50～60尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～8kgサイズを160～295尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～9kgサイズを30～38尾/統・日の漁。

### ○パショウカジキ情報

流し刺網では、甌島海域で1日のみ25～45kgサイズを6～7尾/隻の漁。定置網では、甌島海域で30kgサイズが週計で2尾の入網。旗流しでは、屋久島海域で27～40kgサイズを多い船で2尾/日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～6箱/隻・日の漁。種子島海域では、6～10箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、週計で中トビを40～50箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを26～101箱/統・日、大トビを1～8箱/統・日の漁。


### ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(500～700g)を10～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでカバチ(1kg)を15～20kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(1～5kg)を100kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しでキダイ(20～30kg)を100～200kg/隻・日、旗流しの3日操業でツヅイカ(胴体のみ7～8kg)を20～80kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2631報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	1	54	7	310	
		中	0	—	—	—	6	79	17	482	
	枕崎	大	2	27	宇治 志布志沖	クサヤモロ豆67 マジノ中小28	13.6	10	348	9	792
		中	2	69	津倉 野間池沖	クサヤモロ豆47 ウルメイワシ41 コマサハ小11	34.6	23	595	11	271
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	2	27	—	—	13.6	11	402	16	1,102	
	中	2	69	—	—	34.6	29	674	28	753	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	1	119	—	コマサハ小89 オアカムロ豆7	118.7	2	472	2	343	
棒受網	阿久根	27	38	阿久根沖 長島	ウルメイワシ85 キビナゴ9 カクチイワシ6	1.4	49	54	62	155	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	53	26	—	サバ類中18 ソダガツオ12 ムロアジ12	0.5	47	17	42	41	
刺網	阿久根	16	1	甌 長島	キビナゴ100	0.1	31	2	91	12	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	0	—	—	—	—	—	2	308	0	—
		中	5	39	—	シビ50 カツオ小39 シラ11	7.8	6	52	2	6
海外旋網	山川	海旋	1	721	—	カツオ小73 シビ18 カツオ中5	721.3	5	1995	2	1,467



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月16日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁11月16日発行「海洋速報平成28年213号」による。