

鹿児島県漁海況週報

平成28年12月1日発行(11月24日～11月30日)
第2682報【旧暦：10月25日～11月2日/月齢24.4～0.6/潮汐：長潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月29日現在、平瀬の北4.8マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月29日現在、37マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬で0.1℃昇温し、その他の海域で0.5～2.1℃降温した。

平年比較では、竹島、屋久島御崎、甌海峡で“平年並”、黒潮流域、笠利崎で“かなり高め”、与路島で“著しく高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.4	-0.6	+0.8	かなり高め
鹿児島	21.5	-0.5	+0.9	やや高め
佐多岬	22.9	+0.1	+1.1	やや高め
竹島	23.1	-2.1	+0.1	平年並
屋久島御崎	23.4	-1.8	-0.2	平年並
中之島	24.9	-0.5	+0.6	やや高め
笠利崎	24.8	-0.7	+1.1	かなり高め
与路島	25.2	-1.1	+1.1	著しく高め
与論	25.0	-1.1	+0.8	やや高め
甌海峡	20.5	-1.5	-0.0	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は11/29-30
串木野一甌定期客船観測は11/30

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ウルメイワシ(50～100g)が多い日で1トン、カンパチ(0.5～1kg)が20～130kg/日、マダイ(1kg)が100kg/日、ヒラマサ(4～5kg)が100kg/日の入網。西薩南部海域では、サワ(600g)が1～2トン/日、ゴマサバ(300g)が700～800kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサバ(600～700g)が0.3～1トン/日、カンパチ(0.8～1.3kg)が250～500kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ゴマサバ(300g)が多い日で2.5トン、カンパチ(2～3kg)が週計で800尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がカマス、ヒラウダ、カンパチ主体に21トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサワ、マアジ、アカマス主体に10.4トンの入網。

○パッチ網

西薩海域では、生で1日のみ0.5～1トン/統の漁。志布志湾海域では、製品で12トンの入札があった。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～8kgサイズを8～40尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～5kgサイズを122～232尾/統・日の漁。

○バショウカジキ情報

定置網では、甌島海域で10～50kgサイズが12尾/日の入網。西薩南部海域で5～30kgサイズが2～3尾/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側で30～35kgサイズが2～4尾/日の入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～19箱/隻・日の漁。種子島海域では、5～7箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを20箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを2～15箱/統・日、中トビを55～129箱/統・日の漁。


○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg)を多い日で100kg/隻の漁。西薩南部海域では、かごでウマツラハキ(1kg)を多い日で100kg/隻の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサバ(0.8～1kg)を50kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでムツ(0.5～1kg)を50kg/隻・日、ハマダイ(0.5～2kg)を50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの7日操業でソテイカ(胴体のみ7kg)を371ハイ/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2633報)							
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	4	319	長崎 甌東	マイワシ小38	ウルメイワシ28	カクチイワシ19	79.8	6	331	0	—
		中	12	222	甌西 甌東 阿久根沖 野間池沖	カクチイワシ39	ウルメイワシ20	サバ類小9	18.5	7	130	9	373
	枕崎	大	5	317	新宮 甌東 屋久島南 屋久島南東 種子島南	クサヤモロ豆49	オアカムロ中24	クサヤモロ小16	63.4	3	174	4	501
		中	13	186	種子島東 硫黄島沖 野間池沖 種子島南	クサヤモロ小50	クサヤモロ豆23	ゴマサバ中小13	14.3	15	209	5	60
	内之浦	中	0	—					—	1	5	0	—
	山川	中	0	—					—	0	—	0	—
計	大	9	636					70.7	9	505	4	501	
	中	25	408					16.3	23	344	14	433	
東海旋網	阿久根	0	—					—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—					—	3	620	0	—	
棒受網	阿久根	38	65	阿久根沖 長島	ウルメイワシ86	マアジ仔6		1.7	19	28	5	11	
	内之浦	0	—					—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	52	21		カマス19	ヒラウダ12	カンパチ12	0.4	52	16	50	29	
刺網	阿久根	大	0	—				—	0	—	1	356	
		小	0	—				—	0	—	0	—	
カツオ羊釣	海旋	3	1512		カツオ小40	カツオ中26	キハダ25	504.1	2	1778	0	—	
	中	6	29		キハダ65	カツオ小34		4.8	6	35	0	—	
	海旋	1	420		カツオ中37	カツオ小33	カツオ大18	420.1	2	1128	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月30日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月30日発行「海洋通報平成28年222号」による。