

鹿児島県漁海況週報

平成29年3月2日発行(2月23日～3月1日)
第2694報【旧暦：1月27日～2月4日/月齢26.1～25/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月1日現在、平瀬の南5.1マイル付近にあり、離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月28日現在、78マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で1.5℃昇温し、黒潮流域、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.3～1.1℃降温した。

平年比較では、笠利崎で“著しく高め”、与路島で“かなり高め”、黒潮流域、中之島で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.5	+0.0	+0.5	やや高め
鹿児島	16.1	-0.4	+0.1	平年並
佐多岬	18.0	-0.3	+0.3	平年並
竹島	19.3	-1.1	+0.2	平年並
屋久島御崎	20.2	+1.5	+0.1	平年並
中之島	21.9	-0.4	+0.5	やや高め
笠利崎	21.9	+0.0	+1.2	著しく高め
与路島	21.2	-0.7	+0.5	かなり高め
与論	21.2	-0.5	+0.2	平年並
飯海峡	16.2	-0.4	-0.5	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は3/1～2
串木野一飯定期客船観測は3/1

【漁況】

○定置網

鹿児島海域では、週計でメダ(0.5～2kg)が4.8トン、ブリ(7～8kg)が3.8トンの入網。西薩南部海域では、1日のみカタチイワシ(10g前後)が15トン、サワラ(3kg)が2トン、ブリ(6～10kg)が200尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カタチイワシ(10g前後)が多い日で1.4トン、マアジ(50～80g)が1日のみ600kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カタチイワシ(10g前後)が1日のみ1.8トン、マアジ(100～200g)が100～150kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で43統がマアジ小、カタチイワシ主体に40トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、ニベ類、好ウオ主体に3.4トンの入網。

○キビナゴ刺網

鹿児島海域では、2～18箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、1～2箱/隻・日の漁。種子島海域では、2～3箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを200～300箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを17～68箱/統・日の漁。

○その他


鹿児島海域では、一本釣りでもたい(0.5～5kg)を70kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でもたい(1～1.5kg)を30～70kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1kg)を2～50kg/隻・日の漁。曳網でサワラ(3kg)を20～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、曳網でサワラ(1～4kg)を30～300kg/隻・日の漁。ごち網でもたい(1～4kg)が50～220尾/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～3kg)が60尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でもたい(0.5～3kg)を5～25kg/隻・日、ハモ(0.7～1kg)を10～20kg/隻・日、ヒラメ(1～2kg)を20kg/隻・日の漁。熊本海域では、一本釣りでもたい(3kg)を多い日で300kg/隻、ハマダイ(0.8～7kg)を100kg/隻・日、ムツ(0.5～2kg)を60kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業でワケカ(胴体のみ9kg)を45ハイ/隻の漁。一本釣りの2日操業で好ウオ(1～2kg)が200kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2645報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日					
						1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	8	342	縄瀬 野間池沖	マアジ仔48 サハ類小26 サハ類豆12	42.7	8	321	1	3
		中	24	409	長島 西瀬 野間池沖	カタチイワシ43 マアジ仔23 ウルメイワシ10	17.0	14	255	6	64
	枕崎	大	3	150	野間池沖	マアジ豆53 ゴマサハ小27 ウルメイワシ10	49.9	1	41	5	126
		中	14	490	屋久島南東 種子島東 野間池沖 湯瀬	クサヤモロ小19 オアカムロ小16 ゴマサハ中14	35.0	17	511	17	429
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	11	492			44.7	9	361	6	130	
	中	38	898			23.6	31	766	23	493	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	2	356		ゴマサハ小28 ゴマサハ中24 クサヤモロ小22	177.9	1	43	0	—	
棒受網	阿久根	28	37	阿久根沖 長島	カタチイワシ65 ウルメイワシ32	1.3	7	7	12	14	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	43	40		マアジ小72 カタチイワシ12	0.9	49	33	46	24	
刺網	阿久根	大	1	292	飯 牛深沖 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	30	2	34	3
		小	0	—		カツオ中87 カツオ大12	292.3	0	—	0	—
カツオ羊釣	枕崎	海旋	0	—			—	0	—	0	—
		海外旋網	0	—			—	2	883	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	2	9
		海旋	1	131		カツオ小65 キハダ23 マチ10	131.0	2	901	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月1日発行「海洋通報平成29年40号」による。