

鹿児島県漁海況週報

平成29年8月3日発行(7月27日～8月2日)
第2715報【旧暦:6月5日～6月11日/月齢3.7～9.7/潮汐:中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月1日現在、屋久島御崎の南4.2マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月2日現在、39マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島で0.2℃降温し、その他の海域で0.4～2.2℃昇温した。

平年比較では、甌海峡で“やや高め”鹿児島で“かなり高め”、その他海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	31.3	+0.5	+1.8	著しく高め
鹿児島	29.5	+0.4	+1.8	かなり高め
佐多岬	30.4	+2.1	+2.7	著しく高め
竹島	30.6	+2.2	+2.4	著しく高め
屋久島御崎	30.7	+0.8	+2.1	著しく高め
中之島	30.3	-0.2	+1.5	著しく高め
笠利崎	30.9	+0.8	+2.3	著しく高め
与路島	30.4	+1.3	+1.9	著しく高め
与論	30.4	+1.4	+1.6	著しく高め
甌海峡	29.1	+0.6	+1.1	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は7/30-8/3
串木野一甌定期客船観測は8/3

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でコサダイ(0.5～1.5kg)が100kgの入網。西薩南部海域では、シラ(1～3kg)が0.5～2トン/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(0.9～1.0kg)が1～7トン/日、マアジ豆が0.5～2トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でシラ(1～6kg)が1トン、ハガツオ(1kg)が600kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で31統がカマス、ウルメイワシ、ハガツオ主体に36トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ニベ類、マアジ主体に5.3トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～7箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～15箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、20箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを150～180箱/統・日の漁。屋久島海域では、セトビを40～47箱/統・日、中トビを2～4箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2666報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	43	天草沖 甌西 縄瀬	ウルメイワシ62 サバ類23 マアジ仔12	14.3	3	38	7	135
		中	42	648	長島 甌西	コソロ39 カクチイワシ29 ウルメイワシ12	15.4	32	427	38	441
	枕崎	大	8	209	竹島 甌下 馬毛島	ゴマサハ豆66 ゴマサハ中24 ソウダガツオ5	26.1	6	269	7	280
		中	14	236	竹島 立目崎沖 馬毛島	ゴマサハ中34 ゴマサハ豆26 オアカムロ中17	16.9	20	476	20	618
	内之浦	中	0	—			—	0	—	1	2
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	11	252			22.9	9	306	14	415	
	中	56	884			15.8	52	903	59	1060	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	3	273		ゴマサハ豆79 ゴマサハ小5	91.0	1	106	0	—	
棒受網	阿久根	124	237	阿久根沖 長島	ウルメイワシ78 カクチイワシ19	1.9	127	196	129	235	
	内之浦	0	—			—	5	25	4	11	
定置網	内之浦	31	36		カマス34 ウルメイワシ19 ハガツオ17	1.2	33	20	40	15	
刺網	阿久根	大	0	—	甌 阿久根沖 牛深沖	キビナゴ100	0.1	96	11	71	9
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ羊釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	大	0	—			—	2	1756	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
海外旋網	山川	大	0	—			—	2	4	0	—
		小	0	—			—	1	636	0	—

○バッチ網

西薩海域では、生で500kg/統・日の漁。

○その他

甌島海域では、一本釣りでフリ(2kg)を10～90kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でチダイ(200g)を10～50kg/隻・日、マダイ(300～500g)を6～20kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を20kg/隻・日の漁。一本釣りイサキ(500g)を15～25kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でチダイ(200～400g)を1日のみ20kg/隻の漁。一本釣りイサキ(200～500g)を1日のみ10kg/隻の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りハガツオ(1～4kg)を20～40kg/隻・日、ゴマサハ(800g)を30kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(500～600g)を50～60kg/隻・日、マダイ(1kg)を10～20kg/隻・日の漁。種子島海域では、曳縄でゴマサハ(800g)を50～300kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2日操業でチウオ(1～2kg)を90kg/隻の漁。延縄の3日操業でマダイ(2～4kg)を70kg/隻、キンダイ(1kg)を50kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月2日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月2日発行「海洋速報平成29年145号」による。