

鹿児島県漁海況週報

平成30年8月2日発行(7月26日～8月1日)
第2766報【旧暦:6月14日～6月20日/月齢13.0～19.0/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月31日現在、屋久島御崎の南11.4マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月31日現在、25マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、佐多岬、竹島、屋久島御崎で0.2～0.7℃降温し、鹿児島で変わらず、その他の海域で0.2～1.6℃昇温した。

平年比較では甑海峡で“やや高め”，佐多岬、竹島で“平年並”，その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.8	-0.2	-0.7	やや低め
鹿児島	27.0	+0.0	-0.7	やや低め
佐多岬	27.7	-0.7	-0.0	平年並
竹島	27.9	-0.3	-0.3	平年並
屋久島御崎	27.8	-0.6	-0.8	やや低め
中之島	28.5	+0.9	-0.3	やや低め
笠利崎	27.9	+0.2	-0.7	やや低め
与路島	27.7	+0.5	-0.8	やや低め
与論	28.4	+1.6	-0.5	やや低め
甑海峡	28.8	+0.6	+1.0	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は7/31-8/1
串木野一甑定期客船観測は8/1

【漁況】

※台風の影響で全般に低調な漁模様。

○定置網

西薩南部海域では、シラ(1kg)が2～10トン/日、マルソウダ(500g)が0.2～1トン/日、カツオ(2.5～3kg)が300kg/日、カンパチ(2kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(2.3～3kg)が200～600kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、シラ(1～3kg)が130～400kg/日、カンパチ(0.2～2kg)が50～700kg/日、コマサハ(500～700g)が60～120kg/日、1日のみヒラソウダ(1kg)が160kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で28統がマシ豆、カマス類、マシ小主体に28トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、カタチイワシ、マシ主体に8.6トンの入網。

○キビナゴ刺網

甑島海域では、5～21箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ小トビを30箱/統、大トビを6箱/統、青トビを2箱/統の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.6～1kg)を4～30kg/隻・日、チダイ(200～300g)を3～50kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1kg)を25～30kg/隻・日、メジナ(1kg)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～400kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～600g)を10～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハカツオ(2kg)を60～70kg/隻・日、コマサハ(400～800g)を15kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.5～1.2kg)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでヘダイ(1～1.5kg)を5kg/隻・日、マシ(100～400g)を5kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業でキハダ(20～25kg)を200～500kg/隻の漁。一本釣りの2日操業でチウオ(1.5～2kg)を100～150kg/隻の漁。延縄の3日操業でムツ(1kg)を100kg/隻、キンマダイ(1kg)を100kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2716報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	14	野間池沖 縄瀬	サハ類豆57 マシ仔21 サハ類小12	6.8	2	48	0	—
		中	0	—			—	17	161	1	5
	枕崎	大	0	—			—	8	248	0	—
		中	0	—			—	16	349	1	1
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	2	14			6.8	8	264	0	0	
	中	0	0			—	32	493	2	6	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	1	50	
棒受網	阿久根	18	23	阿久根沖 長島	ウルメイワシ81 カタチイワシ16	1.3	117	291	36	69	
	内之浦	0	—			—	3	7	0	—	
定置網	内之浦	28	28		マシ豆51 カマス類15 マシ小15	1.0	30	72	19	21	
刺網	阿久根	26	3	甑 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	70	11	40	4	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	621		カツオ中70 カツオ小13 キハダ7	621.2	1	704	0	—	
	山川	中	3	35		カツオ小100	11.6	0	—	0	—
海旋		0	—			—	0	—	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月1日発行「海洋速報平成30年143号」による。