

# 鹿児島県漁海況週報

平成30年8月23日発行(8月16日～8月22日)  
第2768報【旧暦:7月6日～7月12日/月齢4.7～10.7/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月19日現在、屋久島御崎の南2.5マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月21日現在、25マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、鹿児島、佐多岬、竹島、甌海峡で0.1～1.0℃降温し、その他の海域で0.1～1.0℃昇温した。

平年比較では屋久島御崎、中之島で“やや高め”，その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.2	-0.1	-0.1	平年並
鹿児島	28.5	-1.0	+0.3	平年並
佐多岬	28.4	-0.1	+0.3	平年並
竹島	28.7	-0.6	+0.3	平年並
屋久島御崎	29.0	+0.1	+0.4	やや高め
中之島	29.1	+0.3	+0.4	やや高め
笠利崎	28.2	+0.7	-0.3	平年並
与路島	28.4	+1.0	+0.0	平年並
与論	28.8	+0.8	+0.1	平年並
甌海峡	28.8	-0.5	+0.5	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は8/19-20  
串木野一甌定期客船観測は8/21

## 【漁況】

台風の影響で全般に低調な漁模様。

### ○定置網

西薩南部海域では、シラ(0.8～1.4kg)が1.5トン/日、ヒラソウダ(400～500g)が200～300kg/日、カンパチ(0.5～1kg)が100～300kg/日、キハタ(4～80kg)が5～10尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(1～2kg)が15～72尾/日、小トビが25～35kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で22統がマアジ、カマス類、ウルメイワシ主体に16トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタチウオ、ニハ類、カクチイワシ主体に4.5トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、7～12箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、7～20箱/隻・日の漁。

### ○パシヨウカジキ情報

定置網では、鹿児島湾口部大隅半島側で週計で15～18kgサイズが4尾の入網。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトビを15～36箱/統・日、中トビを18～30箱/統・日の漁。

### ○その他


甌島海域では、一本釣りマダイ(2～3kg)を10kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網で多い船でマダイ(0.3～1.5kg)を30kg/日、チダイ(200g)を160kg/日の漁。一本釣りでイサキ(400～500g)を多い船で20～25kg/日の漁。かごでシロサバ(200～300g)を150kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを200kg/隻・日の漁。一本釣りでマダイ(1～2kg)を30～50kg/隻・日、イサキ(100～300g)を多い船で15kg/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.4～2.5kg)を50kg/隻・日、ニハ(1～2kg)を40kg/隻・日の漁。一本釣りで1日のみマアジ(300～400g)を15kg/隻、ヘダイ(1～1.5kg)を10kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りの3日操業でハマダイ(3～5kg)を30～120kg/隻、メダイ(3～5kg)を20～40kg/隻の漁。奄美南部海域では、延縄の3日操業でメダイ(2～5kg)を100kg/隻の漁。一本釣りの3日操業でタチウオ(1～1.5kg)を10～20kg/隻、ナンヨウキンメ(1kg)を10～20kg/隻の漁。旗流しでキハタ(10～20kg)を10～20尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2719報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	52	枕崎沖	サハ類小68 サハ類豆32	26.0	1	3	3	86	
		中	207	串木野沖 甌東長島 枕崎沖	サハ類小53 マアジ仔18 カクチイワシ6	11.5	11	135	32	544	
	枕崎	大	532	津倉 馬毛島	ゴマサバ豆59 ゴマサバ中24 ゴマサバ大11	66.4	5	207	9	259	
		中	453	津倉 馬毛島	ゴマサバ豆65 ゴマサバ中26	30.2	12	259	16	486	
	内之浦	中	0			—	0	—	0	—	
	山川	中	0			—	0	—	0	—	
	計	大	10	584			58.4	6	210	12	345
中	33	661				20.0	23	394	48	1031	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	1	32	
棒受網	阿久根	58	180	阿久根沖 長島	ウルメイワシ96	3.1	51	121	98	142	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	22	16		マアジ豆48 カマス類14 ウルメイワシ13	0.7	18	18	32	31	
刺網	阿久根	大	0	甌 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	19	2	42	4	
		小	0	—			—	0	—	0	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	中	0	—		—	0	—	0	—	
		海旋	0	—			—	0	—	3	1328
	山川	中	0	—			—	0	—	4	17
		海旋	2	772		カツオ小54 キハタ27 カツオ中8	386.0	1	669	3	862



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月22日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁8月22日発行「海洋速報平成30年158号」による。