




【海況】
○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
 黒潮北縁域は、2月27日現在、平瀬の北3.8マイル付近にある。
○黒潮流軸(種子島東)
 種子島東の黒潮流軸は、2月26日現在、33マイル付近にある。
○定期船等による表面水温
 各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、中之島、与路島で0.2～1.6℃昇温し、その他の海域で0.1～1.4℃降温した。
 平年比較では、鹿児島、甕海峡で“平年並”、佐多岬で“やや高め”、竹島、屋久島御崎で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃


| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 23.5 | -0.1 | +1.5 | 著しく高め |
| 鹿児島 | 15.9 | -0.1 | -0.3 | 平年並 |
| 佐多岬 | 18.4 | +0.8 | +0.7 | やや高め |
| 竹島 | 20.5 | +1.6 | +1.4 | かなり高め |
| 屋久島御崎 | 21.5 | -1.4 | +1.4 | かなり高め |
| 中之島 | 23.7 | +0.2 | +2.2 | 著しく高め |
| 笠利崎 | 22.7 | -0.3 | +1.9 | 著しく高め |
| 与路島 | 22.5 | +0.4 | +1.8 | 著しく高め |
| 与論 | 22.2 | -0.2 | +1.1 | 著しく高め |
| 甕海峡 | 16.4 | -0.1 | -0.2 | 平年並 |

鹿児島一那覇定期客船観測は2/25-27
 串木野一甕定期客船観測は2/27

【漁況】
○定置網
 甕島海域では、マサバ(0.5～1kg)が130～760kg/日、マシナ(500～800g)が15～470kg/日、フリ(3～13kg)が140～240kg/日の入網。西薩南部海域では、フリ(4～5kg)が200～300尾/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(1～6kg)が80～900尾/日、マシナ(100g)が1日のみ1.5トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がマシナ小、カクチイワシ、サハ類中主体に15トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、フリ、ニハ類主体に5.7トンの入網。
○ブリ銅付け
 鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgを3～20尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3～8kgを70～116尾/統・日の漁。
○トビウオロブ曳網
 種子島海域では、大トビを1日のみ700尾/統の漁。屋久島海域では、大トビを17～101箱/統・日の漁。
○キビナゴ刺網
 甕島海域では、2～5箱/隻・日の漁。
○パッチ網
 西薩海域では、生で200～300kg/統・日の漁。
○その他
 甕島海域では、一本釣りでもたい(0.5～3kg)を2～20kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でもたい(1～6kg)を10～200kg/隻・日の漁。底曳網でツキカイ(100g)を100kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～2kg)を5～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でもたい(0.8～5kg)を30～250kg/隻・日の漁。刺網でもたい(5kg)を1日のみ100尾/隻、ヒラメ(2～3kg)を30～60尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でもたい(1～4kg)を20kg/隻・日、ヒラメ(1～2.5kg)を20kg/隻・日、ハモ(1～1.5kg)を20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでもマサバ(600g)を40尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの10～11日操業でソデイカ(胴体のみ10.5kg)を140ハイ/隻の漁。延縄の2～3日操業でムツ(1～1.5kg)を多い船で100kgの漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています)
業種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同期(第2745報)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日 | 前週 | | 前年同期 | | | | |
|-------|------|-----|---------|-----------|-----------------|----------|---------|--------|-------|-----|-----|-----|----|
| | | | | | | 1統 | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | | | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 2 | 24 | 野間池沖 甕東 | マルアジ大28 | マルアジ中25 | サハ類小18 | 11.8 | 3 | 11 | 0 | — |
| | | 中 | 8 | 24 | 長島 甕東 串木野沖 | マナガツオ36 | マシナ9 | マルアジ大9 | 3.0 | 4 | 13 | 2 | 25 |
| | 枕崎 | 大 | 2 | 263 | 馬毛島 | ゴマサバ中78 | マサバ中19 | | 131.4 | 3 | 70 | 0 | — |
| | | 中 | 13 | 501 | 馬毛島 立目崎沖 甕西 開聞沖 | ゴマサバ中51 | マサバ中19 | マサバ大13 | 38.6 | 8 | 177 | 1 | 6 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 計 | 大 | 4 | 286 | | | | 71.6 | 6 | 81 | 0 | — | |
| 中 | 21 | 526 | | | | | 25.0 | 12 | 190 | 3 | 31 | | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — | | |
| | 枕崎 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — | | |
| 棒受網 | 阿久根 | 19 | 23 | 阿久根沖 長島 | カクチイワシ95 | キビナゴ5 | 1.2 | 13 | 13 | 1 | 1 | | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 0 | — | | |
| 定置網 | 内之浦 | 52 | 15 | | マシナ小29 | カクチイワシ13 | サハ類中13 | 0.3 | 51 | 20 | 34 | 37 | |
| 刺網 | 阿久根 | 47 | 3 | 甕 長島 阿久根沖 | キビナゴ100 | | 0.1 | 24 | 2 | 0 | — | | |
| | 大 | 0 | — | | | | — | 0 | — | 1 | 256 | | |
| カツオ竿釣 | 枕崎 | 小 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | | |
| | 海旋 | 1 | 767 | | カツオ小51 | キハダ25 | カツオ中20 | 767.1 | 0 | — | 1 | 129 | |
| | 海外旋網 | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 海旋 | 山川 | 1 | 816 | | カツオ小76 | キハダ13 | メバチ8 | 816.2 | 0 | — | 1 | 778 | |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月27日付「海況日報」による。
 黒潮流軸は、海上保安庁2月27日発行「海洋運報平成31年37号」による。