

鹿児島県漁海況週報

令和元年5月30日発行(5月23日～5月29日)
第2806報【旧暦:4月19日～4月25日/月齢18.2～24.2/潮汐:中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月28日現在、屋久島御崎の南11.1マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月28日現在、41マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して黒潮流域では変わらず、佐多岬、中之島、甌海域で0.3～0.9℃降温し、その他の海域で0.3～2.5℃升温した。

平年比較では、与路島で“やや高め”、鹿児島、竹島、笠利崎、甌海峡で“かなり高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.2	+0.0	+0.2	平年並
鹿児島	22.8	+0.7	+1.4	かなり高め
佐多岬	22.4	-0.3	+0.4	平年並
竹島	25.1	+2.5	+2.0	かなり高め
屋久島御崎	24.4	+0.3	+0.6	平年並
中之島	25.4	-0.4	-0.1	平年並
笠利崎	25.4	+1.1	+1.2	かなり高め
与路島	24.8	+0.4	+0.8	やや高め
与論	24.4	+0.4	-0.1	平年並
甌海峡	22.9	-0.9	+1.5	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は5/28-29
串木野一那覇定期客船観測は5/29

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でマアジ(100～400g)が5.3トン、ハガツオ(1～2.5kg)が830kg、フエキダイ(1～3kg)が530kgの入網。西薩南部海域では、カンパチ(1～3kg)が100～400kg/日、シイラ(2～3kg)が100～400kg/日、トビウオ(150g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.6kg)が0.5～4.5トン/日、シイラ(2.5～4kg)が1トン/日、キハダ(12kg)が10～20尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でイサキ(200～500g)が4600尾、カンパチ(1.2～4kg)が210尾、ハガツオ(1.5～2kg)が280尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がカタチイワシ、シイラ、マアジ主体に47トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、サバフグ、マアジ主体に15.6トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを26～62箱/統・日、セトビを14～35箱/統・日、青トビを4～11箱/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、10～20箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、3～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で40箱の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.7～1kg)を6～50kg/隻・日の漁。かごで1日のみサバフグ(300g)を200kg/隻の漁。刺網でコウイカ(1kg)を16～50kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒガイを30～32kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～200kg/隻・日の漁。刺網でキス(40～90g)を11～13kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器でトサカリを3トン/日の漁。曳縄でハガツオ(1.5～2kg)を20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でモチ(0.8～1.5kg)を10～15kg/隻・日の漁。熊毛海域では、曳縄でハガツオ(2～3kg)を20～30尾/隻・日の漁。一本釣りゴマサハ(500～600g)を40～50尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの6日操業でソイカ(胴体のみ13～14kg)を10～75ハイ/隻の漁。延縄の4日操業でムツ(1.2kg)を130kg/隻、キンメダイ(2kg)を80kg/隻、ナンヨウキンメ(800g)を60kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2758報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	61	縄瀬 甌東	サバ類中59 サバ類小14 マアジ小9	15.4	2	30	0	—
		中	20	167	縄瀬 長島 甌東 串木野沖	カタチイワシ52 サバ類中15 サバ類小7	8.4	1	8	13	92
	枕崎	大	3	71	屋久新 甌東	クヤモロ中小50 マサハ中小45	23.5	0	—	1	103
		中	9	141	立目崎沖 串木野沖 竹島	ゴマサハ中63 カタチイワシ15 ゴマサハ大7	15.6	1	11	2	11
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	7	132			18.9	2	30	1	103
中	29	308				10.6	2	19	15	103	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	21	17	阿久根沖 長島	カタチイワシ42 サバ類仔24 ウルメイワシ19	0.8	18	9	26	38	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	47		カタチイワシ15 シイラ15 マアジ豆12	1.0	35	74	41	52	
刺網	阿久根	110	30	甌 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.3	51	8	133	26	
	大	0	—			—	0	—	0	—	
カツオ竿釣	枕崎	小	0	—		—	0	—	1	1	
	海旋	1	512		カツオ小66 キハダ21 カツオ中12	512.2	1	601	1	771	
	海外旋網	中	2	6		カツオ小77 ソウダカツオ類15 カツオ大5	3.0	0	—	1	8
海外旋網	山川	1	351		カツオ小66 カツオ中32	350.6	1	752	1	701	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月29日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月29日発行「海洋通報令和元年95号」による。