

鹿児島県漁海況週報

令和元年10月17日発行(10月10日～10月16日)
第2824報【旧暦：9月12日～9月18日/月齢：11.4～17.4/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月15日現在、竹島の南9.7マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月15日現在、50マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で0.1℃昇温し、その他の海域で0.3～1.3℃降温した。

平年比較では、鹿児島、甌海峡で“かなり高め”、与路島、与論で“やや高め”、竹島で“かなり低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.7	-0.7	-0.3	平年並
鹿児島	25.5	-0.3	+1.1	かなり高め
佐多岬	25.6	-0.6	+0.4	平年並
竹島	25.2	-1.3	-0.8	かなり低め
屋久島御崎	26.2	+0.1	-0.2	平年並
中之島	26.6	-0.3	-0.1	平年並
笠利崎	26.6	-0.8	+0.2	平年並
与路島	27.4	-0.7	+0.6	やや高め
与論	27.5	-0.3	+0.6	やや高め
甌海峡	25.8	-1.2	+1.2	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は10/15-16
串木野一甌定期客船観測は10/16

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、サワラ(400～500g)が週計で2トン、ツムフリ(4kg)が100～150kg/日、ヘダイ(400～500g)が100kg/日、カンパチ(500～600g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(3.5～4kg)が100尾/日、ヒマサ(1.7～2kg)が200～300kg/日、カンパチ(0.7～1.2kg)が150kg/日の入網。

鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でシイラ(5～6kg)が470kg、ヤマトカマス(100～300g)が260kg、ツムフリ(1～1.5kg)が250kg、イサキ(400～500g)が230kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がヘダイ、カマス類、サバ類主体に25トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でヘダイ、コシロ、タチウオ主体に22.3トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～7箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、製品で17.8トンの入札があった。西薩南部海域では製品で6トンの入札があった。

○バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で22～30kgが週計で20尾、鹿児島湾口部大隅半島側で25～37kgが週計で7尾の入網。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～4kgを5～220尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～5kgを週計で100尾の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ中トビを43箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(0.8～3kg)を8～30kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒガイ(100g)を16～18kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナカエビを50～250kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(300～500g)を7～8kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(0.9～2kg)を20kg/隻・日、タチウオ(0.7～1.1kg)を10kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(0.3～1kg)を5kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでコマサバ(500～700g)を50尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2777報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期				
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量			
旋網	阿久根	大	2	11	甌東	サバ類65	ウルメイワシ20	サバ類小10	5.7	7	186	1	20
		中	1	12	野間池沖	マルアジ小38	サバ28	サバ類豆13	11.7	7	21	12	120
	枕崎	大	1	38	津倉	ウルメイワシ48	マサバ豆41	コマサバ豆10	37.8	7	685	7	230
		中	2	32	津倉	ウルメイワシ78	マサバ豆17	コマサバ豆4	16.0	17	437	17	418
	内之浦	中	0	—					—	0	—	0	—
	山川	中	0	—					—	0	—	0	—
計	大	3	49			16.4	14	871	8	249			
	中	3	44			14.5	24	458	29	538			
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—			
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—			
棒受網	阿久根	11	22	阿久根沖 長島	ウルメイワシ75	キビナゴ17	サバ7	2.0	27	68	23	43	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—			
定置網	内之浦	34	25		ヘダイ19	カマス類9	サバ類6	0.7	37	13	33	14	
刺網	阿久根	16	1	甌 川内沖	キビナゴ100	0.1	22	2	27	4			
カツオ羊釣	大	枕崎	0	—		—	0	—	0	—			
		小	0	—		—	0	—	0	—			
	海外旋網	海旋	1	710		カツオ中69	キハダ26		709.8	0	—	2	1432
		山川	中	1	2		キハダ75	カツオ小25		2.4	0	—	7
	海旋	1	712		カツオ小66	キハダ25	カツオ中7		711.6	1	667	2	1469



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月16日付「海況日報」による。
黒潮流域は、海上保安庁10月16日発行「海洋通報令和元年190号」による。