

鹿児島県漁海況週報

令和2年4月2日発行(3月26日～4月1日)
第2847報【旧暦:3月3日～3月9日/月齢:1.7～7.7/潮汐:中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月31日現在、竹島の南10.9マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月31日現在、46マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、中之島、与路島で0.1～1.6℃降温し、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.2～3.1℃昇温した。

平年比較では、屋久島御崎で“かなり高め”、笠利崎、与路島、与論、甬海峡で“やや高め”、佐多岬で“かなり低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.4	+0.5	+0.4	平年並
鹿児島	17.3	+0.7	+0.3	平年並
佐多岬	17.3	-1.6	-1.5	かなり低め
竹島	20.1	-1.0	-0.3	平年並
屋久島御崎	23.0	+3.1	+1.9	かなり高め
中之島	22.5	-0.3	+0.1	平年並
笠利崎	22.3	+0.0	+0.8	やや高め
与路島	21.7	-0.1	+0.5	やや高め
与論	22.1	+0.2	+0.5	やや高め
甬海峡	18.7	+0.6	+1.0	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は3/31-4/1
串木野一那覇定期客船観測は4/1

【漁況】

○定置網

甬島海域では、週計でブリ(8～10kg)が100kg、カサゴ(250g)が100kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(6～7kg)が250～700尾/日、イサキ(300～400g)が1日のみ200kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マサシ(80g)が1～5.5ト/日、ブリ(1.1～7kg)が0.8～1.9ト/日、チウオ(800g)が130～350kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマサシ(200～400g)が3.7ト、マサハ(800g)が400kg、クロダイ(1kg)が300kg、チウオ(800g)が190kg、ヒラマシ(1～2kg)が110kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で48統がブリ、サハ類中主体に66トの入網。志布志湾南部海域では、週計でサハ類、カクチイワシ、ブリ主体に9.8トの入網。

○キビナゴ刺網

甬島海域では、2～6箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～15箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、生で1～2ト/統・日の漁があり、製品で7トの入札があった。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを1日のみ2000尾/統の漁。屋久島海域では、大トビを87～417箱/統・日、中トビを7～53箱/統・日の漁。

○その他


甬島海域では、曳縄でハカツオ(1.5kg)を週計で150kgの漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を7～80kg/隻・日、チダイ(200～300g)を5～29kg/隻・日の漁。延縄で1日のみキダイ(300g)を17kg/隻、アカマダイ(300g)を10kg/隻の漁。曳縄でサワラ(1kg)を7～11kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒガイ(100g)を31～61kg/隻・日の漁。刺網でメノ(0.5～1kg)を20kg/隻・日、ヒラメ(1kg)を1日のみ11kg/隻の漁。西薩南部海域では、曳縄でハカツオ(1.5～2kg)を20～150kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～300g)を10～20kg/隻・日、ヘダイ(1～1.5kg)を10～20尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でイホダイ(100～400g)を10kg/隻・日、カイワリ(200～400g)を20kg/隻・日、マダイ(0.7～1.5kg)を10kg/隻・日、ヒラメ(0.6～2kg)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を60尾/隻・日、マダイ(3～4kg)を1日のみ10kg/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～6日操業でソテイカ(胴体のみ10～11kg)を13～30ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ等の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2800報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	90	甬東 天草沖	サハ類大69 サハ類豆22	17.9	6	86	7	342
		中	12	210	甬東 野間池沖	サハ類大63 サハ類豆28	17.5	16	278	12	325
	枕崎	大	8	512	甬西 志布志沖	マサハ中78 マサハ中小11 マサハ大8	63.9	8	1118	10	814
		中	13	446	志布志沖 甬下立目崎沖 津倉	マサハ中64 マサハ中小16 マサハ大8	34.3	19	1089	19	846
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	13	601			46.2	14	1204	17	1156	
	中	25	655			26.2	35	1367	31	1171	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	2	0.3	阿久根沖	カクチイワシ74 ウルメイワシ26	0.2	13	6	27	23	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	48	66		ブリ77 サハ類中6	1.4	51	33	50	22	
刺網	阿久根	大	25	2	長島 甬阿久根沖	キビナゴ100	0.1	44	4	92	9
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	0	—			—	0	—	1	1164
海外旋網	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	1	761		カツオ小44 キダダ35 カツオ中16	760.7	1	260	1	880



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月1日発行「海洋通報令和2年59号」による。