

鹿児島県漁海況週報

令和2年8月13日発行(8月6日～8月12日)
第2865報【旧暦：6月17日～6月23日/月齢：16.4～22.4/潮汐：大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月11日現在、屋久島御崎の北7.2マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月11日現在、75マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、中之島、与論で0.2～1.0℃降温し、甌海峡で変わらず、その他の海域で0.2～0.9℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、鹿児島、笠利崎、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.9	-0.2	+0.5	やや高め
鹿児島	29.3	+0.3	+1.1	やや高め
佐多岬	28.0	+0.9	-0.1	平年並
竹島	28.1	+0.2	-0.2	平年並
屋久島御崎	29.0	+0.4	+0.3	平年並
中之島	29.1	-1.0	+0.3	平年並
笠利崎	29.8	+0.2	+1.2	やや高め
与路島	28.9	+0.4	+0.5	平年並
与論	29.0	-0.2	+0.2	平年並
甌海峡	29.1	+0.0	+1.0	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は8/11～12
串木野～甌定期客船観測は8/12

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ニサダイ(1.5kg)が400～700kg/日の入網。西薩南部海域では、1日のみカイワリ(100g)が400kg、メジナ(1kg)が200kg、イサキ(200g)が100kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみゴマサハ(200～250g)が300kg、キハダ(45～51kg)が3尾、ハシヨウカジキ(26kg)が1尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハガツオ(1.6kg)が1.4トン、ヒラソウダ(1.2kg)が1トン、イサキ(800g)が500kg、シマアジ(600～800g)が150kg、ハシヨウカジキ(24kg)が1尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で41統がサハ類小、ハガツオ、マアジ仔主体に72トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でハガツオ、チウオ、マアジ主体に11.8トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～7箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ小トビを14箱/統の漁。屋久島海域では、1日のみ中トビを1箱/統、セトビを26箱/統の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.7～2kg)を10～30kg/隻・日、チダイ(200～300g)を5～20kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(2kg)を15～17kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を13～14kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを50～150kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを週計で7トンの漁。志布志湾海域では、底曳網でコウイカ(200～300g)を30kg/隻・日、ニヘ(2kg)を20kg/隻・日、マダイ(1kg)を10～20kg/隻・日、イホダイ(100～200g)を10～20kg/隻・日の漁。かごでハイ(100g)を10～20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りの2日操業でハマダイ(3kg)を150～200kg/隻、アオダイ(1kg)を150kg/隻、ヒメダイ(1kg)を30～40kg/隻、マダイ(5～6kg)を25～30kg/隻の漁。一本釣りの日帰り操業でタマガシラ(300～400g)を50kg/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2日操業でムツ(1kg)を80kg/隻、ハマダイ(2～4kg)を50kg/隻、マダイ(2～3kg)を30kg/隻、アオダイ(1～1.5kg)を10～20kg/隻、チウオ(1～1.7kg)を11～12kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2818報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	3	145	
		中	5	18	串木野沖	サハ類豆28 マアジ仔24 ウルメイワシ22	3.6	12	45	12	125
	枕崎	大	2	9	馬毛島 種子島東	ゴマサハ中58 ゴマサハ中小36 クサヤモロ中6	4.7	2	62	7	356
		中	3	50	馬毛島 枕崎沖	ゴマサハ中60 ウルメイワシ36	16.7	6	64	21	524
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	2	9	—	—	4.7	2	62	10	501	
	中	8	68	—	—	8.5	18	109	33	649	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	4	4	長島	カタチイワシ48 ウルメイワシ43	0.9	74	101	58	87	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	41	72	—	サハ類小40 ハガツオ24 マアジ仔15	1.8	32	57	29	12	
刺網	阿久根	25	4	甌 牛深沖 長島	キビナゴ100	0.1	41	6	56	6	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	大	2	1376	—	カツオ小61 キハダ21 カツオ中16	688.1	1	773	0	—
		中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
海旋	山川	1	105	—	カツオ小62 カツオ中22 キハダ10	105.0	2	1909	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月12日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁8月12日発行「海洋通報令和2年147号」による。