



## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月21日現在、平瀬の北11マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月25日現在、88マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、中之島、与路島で0.2～0.9℃降温し、鹿児島、竹島で変わらず、その他の海域で0.2～0.8℃升温した。

平年比較では、笠利崎、与論で“著しく高め”、黒潮流域、佐多岬、屋久島御崎で“かなり高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.4	-0.2	+1.1	かなり高め
鹿児島	29.2	+0.0	+1.0	やや高め
佐多岬	29.2	+0.8	+1.1	かなり高め
竹島	29.1	+0.0	+0.7	やや高め
屋久島御崎	29.8	+0.2	+1.2	かなり高め
中之島	29.3	-0.4	+0.6	やや高め
笠利崎	30.6	+0.2	+2.1	著しく高め
与路島	29.2	-0.9	+0.8	やや高め
与論	30.4	+0.5	+1.7	著しく高め
甕海峡	29.4	+0.4	+1.2	やや高め

鹿児島ー那覇定期客船観測は8/21～23  
串木野ー甕定期客船観測は8/24

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、シラ(2～3kg)が300kg/日、ゴマサハ(130～150g)が60～80kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がマシ豆、ウルメイワシ、サハ類中主体に23トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタチウオ、マシ、ニハ類主体に5.8トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甕島海域では、3～9箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを40箱/統・日、中トビを10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを5～7箱/統・日、セトビを11～21箱/統・日の漁。

### ○イセエビ刺網

西薩海域では、200～500gサイズを2～15kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、200～400gサイズを20～30kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、0.2～1kgサイズを1～4kg/隻・日の漁。

### ○その他


甕島海域では、一日のみ曳縄でスマ(0.5～1kg)を60kg/隻の漁。一日のみかごでスジアラ(2～8kg)を20kg/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～1kg)を7～50kg/隻・日、チダイ(300g)を一日のみ13kg/隻の漁。一本釣りでイサキ(400～500g)を30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～300kg/隻・日の漁。曳縄でハカツオ(1kg)を20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハカツオ(2～3kg)を70～80kg/隻・日、ブリ(6kg)を70～80kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.6～1.2kg)を30kg/隻・日、オオニハ(1～5kg)を30kg/隻・日、マダイ(1～2kg)を20kg/隻・日の漁。種子島海域では、一本釣りでカンパチ(3～5kg)を10尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの4～5日操業でキハダ(30～50kg)を31～40尾/隻、メハチ(20～30kg)を1～2尾/隻、ピンナガ(15～30kg)を3～5尾/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2815報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	370	天草沖	マイワシ小83 ウルメイワシ12	74.0	2	17	7	195
		中	17	112	長島 串木野沖 牛深沖 野間池沖	ウルメイワシ17 マイワシ小13 サハ類小13	6.6	15	89	6	89
	枕崎	大	3	102	甕東 屋久新曾根	オアカムロ中小22 オアカムロ中20 ウルメイワシ20	34.0	3	119	4	137
		中	14	171	島間沖 種子島南 野間池沖	クサヤモロ小33 マサハ豆11 ゴマサハ中小11	12.2	5	60	10	182
	内之浦	中	0	—			—	0	—	1	6
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	8	472			59.0	5	136	11	332	
	中	31	283			9.1	20	149	17	277	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	84	149	阿久根沖 長島	ウルメイワシ73 カクチイワシ24	1.8	56	103	83	131	
	内之浦	0	—			—	0	—	1	2	
定置網	内之浦	35	23		マシ豆36 ウルメイワシ15 サハ類中9	0.7	18	24	25	47	
刺網	阿久根	37	6	牛深沖 甕 川内沖 長島	キビナゴ100	0.2	36	5	79	14	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	中	0	—			—	1	852	0	—
		海旋	0	—			—	0	—	0	—
海外旋網	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	1	1102		カツオ小91 キハダ7	1,102.0	1	628	1	738



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月26日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁8月26日発行「海洋速報令和2年157号」による。