

鹿児島県漁海況週報

令和4年6月23日発行(6月16日～6月22日)
第2958報【旧暦：5月18日～5月24日/月齢16.6～22.6/潮汐：中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月19日現在、中之島の南2マイル付近にあり、離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月21日現在、32マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で0.8℃降温し、竹島、笠利崎、与路島で変わらず、その他の海域で0.1～1.6℃昇温した。

平年比較では、屋久島御崎、与路島、与論で“かなり低め”、黒潮流域、竹島、中之島で“やや低め”、甕海峡で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.5	+0.2	-0.7	やや低め
鹿児島	23.5	+0.6	-0.1	平年並
佐多岬	23.9	+0.6	+0.1	平年並
竹島	23.9	+0.0	-0.7	やや低め
屋久島御崎(永田岬)	23.8	-0.8	-1.5	かなり低め
中之島	26.0	+1.3	-0.6	やや低め
笠利崎	25.5	+0.0	-0.2	平年並
与路島	24.0	+0.0	-1.2	かなり低め
与論	24.9	+0.1	-1.0	かなり低め
甕海峡	25.8	+1.6	+2.2	著しく高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、6/19～20(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は6/22

【漁況】

○定置網

甕島海域では、メジナ(500～800g)が100kg/日、シマジ(300～500g)が30kg/日、ウスバハキ(0.7～1kg)が30kg/日、フエキダイ(2～4kg)が30kg/日、1日のみイサキ(200～800g)が70kgの入網。西薩南部海域では、ハガツオ(300～600g)が0.1～1.1t/日、シイラ(4kg)が30～400kg/日、マダイ(2kg)が50kg/日、1日のみブリ(5～7kg)が400kg、週計でパシウカジキ(25kg)が2尾、シロカワジキ(55kg)が1尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(600～700g)が1.5～2t/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でイサキ(0.8～1.3kg)が530kg、ハガツオ(500～800g)が250kg、カンパチ(1.2～4kg)が170kg、ゴマサバ(1kg)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計でウルメイワシ、マアジ豆、サバ類中主体に13tの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、ウルメイワシ、テンジク好主体に18tの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、3～8箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～20箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトビを13～73箱/統・日、青ビを3～45箱/統・日、中ビを1～7箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を20～36kg/隻・日、チダイ(100～300g)を10～25kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～500g)を5～20kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を10～12kg/隻・日の漁。曳縄でハガツオ(500～800g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを30～150kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業で1日のみサカリを2.5tの漁。志布志湾海域では、刺網でアカシヒラメ(400～500g)を50kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサバ(600～700g)を20～30尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～5日操業でツテイ(胴体のみ13.2kg)を192kg/隻の漁。延縄の2日操業でムツ(1～1.5kg)を34kg/隻、ナンヨウキンメ(1.5kg)を26kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2909報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	3	串木野沖	マアジ小70 ハガツオ13 マアジ豆6	3.0	1	30	0	—
		中	10	77	串木野沖 長島 甕東	マアジ小32 カクチイワシ14 マルアジ小11	7.7	5	19	4	51
	枕崎	大	3	111	屋久島南	ゴマサバ中75 ゴマサバ中小22	37.0	1	3	2	60
		中	3	22	串木野沖 湯瀬 屋久島南	ゴマサバ中22 マルアジ小21 ゴマサバ豆19	7.2	3	42	3	22
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	4	114			28.5	2	33	2	60
中	13	98				7.6	8	61	7	73	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	9	6	長島 阿久根沖	ウルメイワシ37 サバ類豆32 カクチイワシ23	0.6	31	22	21	13	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	27	13		ウルメイワシ27 マアジ豆17 サバ類中16	0.5	34	26	36	69	
刺網	阿久根	52	8	甕 阿久根沖 川内沖 長島	キビナゴ100	0.2	83	18	61	7	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
		海旋	0	—			—	2	1901	1	152
	山川	中	6	49		カツオ中36 カツオ小32 カツオ大26	8.2	1	6	2	9
海旋	1	840		カツオ小68 キハダ18 カツオ中12	839.8	1	722	0	—		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月22日付「海況日報」による。
黒潮流域は、海上保安庁6月22日発行「海洋通報令和4年114号」による。