

鹿児島県漁海況週報

令和4年12月1日発行(11月24日～11月30日)
第2981報【旧暦：11月1日～11月7日/月齢0.2～6.2/潮汐：大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月27日現在、屋久島御崎の北0.1マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月29日現在、28マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、笠利崎、与路島で0.2～0.8℃昇温し、鹿児島で変わらず、その他の海域で0.3～1.1℃降温した。

平年比較では、中之島、甕海峡で“かなり高め”，その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.2	-0.3	+1.5	著しく高め
鹿児島	23.5	+0.0	+2.8	著しく高め
佐多岬	24.6	+0.8	+2.7	著しく高め
竹島	25.2	+0.2	+2.1	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	25.9	-0.3	+2.3	著しく高め
中之島	25.6	-0.8	+1.2	かなり高め
笠利崎	25.4	+0.2	+1.5	著しく高め
与路島	26.0	+0.5	+1.7	著しく高め
与論	25.9	-0.7	+1.5	著しく高め
甕海峡	22.2	-1.1	+1.7	かなり高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、11/27～28
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、11/30

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ウルメイワシ(100g)が200～500kg/日、カマスサワ(5kg)が50kg/日、カンパチ(1kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.4～1.9kg)が190～500kg/日、カンパチ(0.8～1.5kg)が100～410kg/日、スマ(1.3～2.7kg)が150kg/日、1日のみシマアジ(1.1～1.3kg)が60kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(0.9～1.1kg)が300kg、マアジ(100～300g)が270kg、スマ(2～5kg)が140kg、カマスサワ(10kg)が80kg、シマアジ(0.5～1kg)が75kg、1日のみキハダ(5～8kg)が90kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がカンパチ、チウオ、ブリ主体に15tの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、ニベ類、サワラ主体に9.6tの入網。

○キビナゴ刺網

種子島海域では、3～4箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中トビを35～44箱/統・日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(4～5kg)を5～50尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、ブリ(5～5.5kg)を31～141尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、ブリ(3.8～8.5kg)を12～43尾/隻・日の漁。

○その他


甕島海域では、一本釣りでゴマサバ(700～800g)を113kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキガイ(100g)を30～50kg/隻・日の漁。曳縄でカマスサワ(4～5kg)を5～10尾/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(400～800g)を24kg/隻・日、マアジ(150g)を5～6kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を3～20kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を8～10kg/隻・日の漁。刺網で1日のみイセエビ(200g)を18kg/隻の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100～200kg/隻・日の漁。曳縄でカマスサワ(5～6kg)を120kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(3～4kg)を50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～7日操業でソデイカ(胴体のみ5～10kg)を0.2～1.2t/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2932報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	123	五島東 牛深沖	マアジ仔64 サバ類豆19 ウルメイワシ17	30.7	11	541	0	—
		中	7	189	串木野沖	サバ類小35 マアジ仔27 サバ類豆14	27.0	7	191	7	76
	枕崎	大	3	115	臥蛇島	クサヤモロ小67 クサヤモロ中小27	38.3	3	59	7	135
		中	11	204	坊津沖 島間沖 西新曾根 屋久島南	クサヤモロ中小53 クサヤモロ小18	18.6	14	321	14	374
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	7	238			34.0	14	600	7	135
中	18	393				21.8	21	513	21	450	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎	4	256	西沖	ゴマサバ豆45 ゴマサバ大30 サバ大14	64.1	9	306	1	84	
棒受網	阿久根	10	3	阿久根沖 長島	キビナゴ87 カクチイワシ10	0.3	38	22	15	37	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	34	15		カンパチ34 チウオ14 ブリ10	0.4	41	16	35	12	
カツオ竿釣・海外旋網	阿久根	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	枕崎	海旋	1	610		カツオ小77 カツオ中11 キハダ6	610.2	0	—	0	—
		中	5	22		カツオ小52 キハダ46	4.4	1	3	0	—
	山川	海旋	2	972		カツオ小57 カツオ中34 キハダ6	486.1	0	—	1	179



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月30日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月30日発行「海洋速報令和4年221号」による。