

鹿児島県漁海況週報

令和6年7月25日発行(7月18日～7月24日)
第3063報【旧暦:6月13日～6月19日/月齢12.2～18.2/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月22日現在、屋久島御崎の北5.6マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月23日現在、74マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎で0.4℃降温し、その他の海域で0.3～3.6℃昇温した。

平年比較では、甌海峡で“やや高め”、鹿児島で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	31.4	+0.4	+2.1	著しく高め
鹿児島	29.4	+3.6	+1.9	かなり高め
佐多岬	29.3	+2.5	+2.1	著しく高め
竹島	30.3	+2.4	+2.6	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	31.3	+2.2	+3.0	著しく高め
中之島	31.4	+1.3	+2.7	著しく高め
笠利崎	30.6	-0.4	+2.1	著しく高め
与路島	30.9	+1.1	+2.7	著しく高め
与論	30.9	+0.3	+2.3	著しく高め
甌海峡	28.7	+1.0	+1.5	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、7/22～23
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、7/23

【漁況】 主要な魚種のみ記載しています。

○定置網

甌島海域では、1日のみジン(700～800g)が200kg、カンパチ(1kg)が200kgの入網。西薩南部海域では、スマ(1.5～2kg)が100～400kg/日、カンパチ(1kg)が200kg/日、ヤマトカマス(100g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でヒラソウダ(1～2kg)が4tの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がマジン仔、ウルメイワシ、カマス類主体に26tの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、マジン、ヤマトカマス主体に5.3tの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～6箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～20箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを1日のみ6箱/統の漁。屋久島海域では、セトビを5～57箱/統・日、中トビを2～5箱/統・日の漁。


○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.4～1kg)を5～50kg/隻・日、チダイ(300g)を10～40kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～500g)を22～40kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を3～5kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを週計で4.5tの漁。志布志湾では、かご網でマダコ(0.8～1.5kg)を5kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りの2～3日操業でハマダイ(1～6kg)を200kg/隻、アオダイ(1kg)を100kg/隻、1日操業でカンパチ(10kg)を6～7尾/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣りの1～2日操業でナンヨウキンメ(1～1.5kg)を18kg/隻、ハマダイ(1.5～3kg)を6kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	※前年同期(第3013報)				
							前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	0	—	4	179	
		中	1	12	串木野沖	マジン豆61 マジン仔25 マイワシ中6	12.0	5	40	15	202
	枕崎	大	2	24	屋久島南 湯瀬	オアカムロ中29 クサヤモロ中小28 ゴマサハ中小27	12.0	2	65	7	168
		中	1	12	津倉	ゴマサハ中88 クサヤモロ中小11	12.0	4	154	18	481
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	2	24			12.0	2	65	11	347	
	中	2	24			12.0	9	194	33	683	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	1	11	0	—	
棒受網	阿久根	20	20	阿久根沖 長島	マイワシ小40 ウルメイワシ37 カクチイワシ20	1.0	26	26	79	134	
	内之浦	0	—			—	0	—	3	19	
定置網	内之浦	35	26		マジン仔27 ウルメイワシ17 カマス類11	0.7	29	38	34	32	
刺網	阿久根	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	海旋	1	75		カツオ中95	75.0	0	—	0	—
		中	1	5		カツオ小63 キハダ24 メハチ11	5.0	3	12	5	56
	山川	海旋	0	—			—	0	—	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月24日付「海況日報」による。
黒潮流域は、海上保安庁7月24日発行「海洋速報令和6年137号」による。